

עלון לצרכן לפי תקנת הרחוקים (תשס"ח) 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ג'ובונטי

גמישה הזרקה תת-עורית

חומר פעיל:

כל מזרק מוכן לשימוש מכיל:
דנוסומאב 60 מ"ג ב-1 מ"ל של תמיסה denosumab 60 mg in 1 ml solution

חומרים בלתי פעילים אולרג'נים בתכשיר:
ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וכן פרק 6 "מידע נוסף"

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
התופה זו נכילה מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקה.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר ג'ובונטי קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליו לדעת, לפני תחילת הטיפול ובמהלך הטיפול בג'ובונטי ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל לצורך לרכוש בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

ג'ובונטי הינו תכשיר ביוסימילאר. למידע נוסף על תכשירי ביוסימילאר יש לפנות לאתר משרד הבריאות:
https://www.gov.il/he/Departments/General/biosimilar

1. למה מיועדת התרופה?

ג'ובונטי אינה מיועדת לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

ג'ובונטי משמשת לטיפול:

- בדלדול עצם בשנים לאחר לך המעבר (פוסט-מנופאזה) ובגברים שיש להם סיכון מוגבר לשברים (עצמות שבורות), ככל שהיא מפחיתה את הסיכון לשברים בעוד שהשרה, שאלה בעמוד השדרה ובאגן.
- באיבוד מסת עצם כתוצאה מירידה ברמות הורמון (טסטוסטרון) הנגרם על ידי ניתוח או טיפול בתרופות במטופלים שיש להם סרטן בלוטת הערמונית.
- באיבוד מסת עצם כתוצאה מטיפולי מערכתי ממושך בגלוקוקורטיקואידים, במינון יומי שווה-לערך ל-7.5 מ"ג או יותר של פרדניזון, כשצפי שהטיפול בגלוקוקורטיקואידים יימשך לעוד 3 חודשים לפחות, במטופלים מבוגרים הנמצאים בסיון גבוה לשבר.

קבוצה תרופטיית: תרופות לטיפול במחלת עצם - תרופות אחרות המשפיעות על מבנה העצם ועל מינרליזציה.

ג'ובונטי מכילה דנוסומאב, חלבון (נוגדן מנוקלוגלי) שמפריע לפעילות של חלבון אחר, על מנת לעצב באיבוד מסת עצם ובדלדול עצם (אוסטאופורוזיס). טיפול בג'ובונטי מחזק את העצמות ומפחית את הסיכרות שתישברנה.

עצם היא רקמה חיה ומתחדשת כל הזמן. אסטרוגן מסייע לשמור על בריאות העצמות. לאחר גיל המעבר, יש ירידה ברמות האסטרונ הכוללה לגרם לעצמות הידיקה ולהפוך לשבירות. זה יכול בסופו של דבר להוביל למצב הנקרא דלדול עצם. דלדול עצם יכול גם להתרחש בגברים בשל מספר גורמים הכוללים התקדנות ואו רמה נמוכה של הורמון מגן זכר, טסטוסטרון. זה יכול גם לקרות למטופלים המקבלים גלוקוקורטיקואידים. למטופלים רבים עם דלדול עצם אין תסמינים, אבל הם עדיין בסיכון לשבירת עצמות, במיוחד בעמוד השדרה, במפרקי הירכיים ובמפרקי הידיים.

ניתוח או תרופות המפסיקות את הייצור של אסטרוגן או טסטוסטרון, הניתנות לטיפול בחולים שיש להם סרטן שד או סרטן בלוטת הערמונית, יכולים לגרום לאיבוד עצם. העצמות נעשות חלשות יותר וששברות בקלות רבה יותר.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- יש לך רמות נמוכות של סידן בדם (היפוקלצמיה).
- אתה גריש (אלרגי) לדנוסומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

פנה לרופא או לרוקח לפני השימוש בג'ובונטי.

במהלך הטיפול בג'ובונטי, עלול להתפתח יהיום בעור עם תסמינים כגון אזור אדמומי ונפוח בעור, בדרך כלל בחלק התחתון של הרגל, שתייה בו גרישות ותחושת חום (צלוליטיס), וייתכן שילווה בתסמינים של חום.
אנא פנה מייד לרופא אם תפתח כל אחד מתסמינים אלה.

עלך גם לקחת ויטמין D ותוספי סידן במהלך הטיפול בג'ובונטי. הרופא ישוחח על כך איתך.

ייתכן שיהיו לך רמות נמוכות של סידן בדם כשאתה מקבל טיפול בג'ובונטי. אנא פנה לרופא מייד אם אתה מבחין בכל אחד ההתסמינים הבאים: התכווצויות, עוויתות בשיריר /או חוסר תחושה או קצוצץ באצבעות הידיים, בהונות הרגליים או מסביב לפה ו/או פרנסים (התקפים), בלבול או איבוד ההכרה.

רמות נמוכות של סידן בדם בדרגה חמורה המובילות לאשפוז ואף לתגובות מסכנות חיים דוחו במקרים נדירים. לכן, לפני כל מנה במטופלים עם נטייה להיפוקלצמיה במהלך השבועיים הראשונים לאחר המנה הראשונית, רמות הסידן בדם ייבדקו (באמצעות בדיקת דם).

ספר לרופא אם יש לך או אם פעם היו לך בעיות כליה חמורות, אי ספיקת כליות או שנזקקת ל"דיליזה", או אם הינך לוקח תרופות הנקראות גלוקוקורטיקואידים (כמו פרדניזולון או אדקומטוזון). העלולים להגביר את הסיכון שיהיו לך רמות סידן נמוכות בדם אם את ליתקח תוספי סידן.

בעיות בפה. שיניים או לסת

תופעת לואי הנקראת נמק של עצם הלסת (ONJ) (מק לעצם הלסת) דוחה לעיתים נדירות (עשויה להופיע ב-עד 1 מתוך 1,000 אנשים) במטופלים המקבלים דנוסומאב לטיפול בדלדול עצם. הסיכון לנמק של עצם הלסת עולה בחולים המטופלים לאורך זמן (עשוי להופיע ב-עד 1 מתוך 200 אנשים אם מטופלים במשך 10 שנים). נמק של עצם הלסת יכול להופיע גם לאחר הפסקת טיפול. חשוב לנסות למנוע התפתחות נמק של עצם הלסת מכיוון שזה עלול להיות מצב נואב שיכול להיות קשה לטיפול. על מנת להפחית את הסיכון להתפתחות נמק של עצם הלסת, עליך לנקוט באמצעי זהירות הבאים:

לפני קבלת טיפול, ספר לרופא או לאחות (לצוות הרפואי) אם:

- שן מתנוונת.
- אתה אל מקבל טיפול שיניים שגרות או שלא הייתה לך בדיקת שיניים במשך זמן רב.
- אתה מעשן (שכן זה עלול להעלות את הסיכון לבעיות שיניים).
- קיבלת לאחרונה טיפול בביספוספונאט (משמש לטיפול או למניעה של בעיות בעצמות).
- אתה לוקח תרופות הנקראות קורטיקוסטרואידים (כמו פרדניזולון או דקסמתזון).
- יש לך סרטן.

ייתכן שהרופא יבקש ממך לעבור בדיקת שיניים לפני שאתה מתחיל טיפול בג'ובונטי. בזמן שאתה מקבל טיפול, עליך להקפיד על הגייגנת פה טובה ולעבור בדיקות שיניים שגרותיות. אם יש לך שיניים תוחבות עליך לודא שגן מותאמות כראוי. אם אתה במהלך טיפול שיניים או עתיד לעבור ניתוח במצעי מניעה ייעילים במהלך הטיפול בג'ובונטי לשיניים ואמור לרופא השיניים שאתה מקבל טיפול בג'ובונטי.

פנה לרופא ולרופא השיניים מייד אם אתה חווה בעיות בלישהן בפה או בשיניים כגון שיניים רופפות, כאב או נפיחות, או פצעים שאינם מחלים או הפרשה, מכיוון שאלה עלולים להיות סימנים לנמק של עצם הלסת.

שברים חריגים בעצם הירך

אנשים מסוימים פיתחו שברים חריגים בעצם הירך בזמן שהם מטופלים בג'ובונטי. צור קשר עם הרופא אם אתה חווה כאב חדש או חריג באגן, במפשעה או בירך.

ג'ובונטי ומתבגרים

ג'ובונטי אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי חזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופה אחרת המכילה דנוסומאב

אל תיקח ג'ובונטי יחד עם תרופות אחרות המכילות דנוסומאב.

היריון והנקה

דנוסומאב אל נבדקה בנשים הרות. חשוב שתאמרי לרופא אם את בהיריון, ושובשת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת להרות. ג'ובונטי אינה מותאמת לשימוש אם את בהריון. נשים בגיל הפוריות גריכות להשתמש באמצעי מניעה ייעילים במהלך הטיפול בג'ובונטי ולפחות למשך 3 חודשים לאחר הפסקת הטיפול בג'ובונטי.

אם את נכנסת להריון במהלך הטיפול בג'ובונטי או פחות מ-5 חודשים לאחר הפסקת הטיפול בג'ובונטי, אנא ידעי את הרופא.

לא ידוע אם דנוסומאב מופרשת בחלב אם או לא. חשוב לספר לרופא אם את מניקה או מתכננת לעשות זאת. הרופא יעזור לך להחליט האם להפסיק את הנקה או אם להפסיק לקחת ג'ובונטי, בהתחשב בתועלת התינוק ובתועלת של ג'ובונטי לאם.

אם את מניקה במהלך הטיפול בג'ובונטי, אנא ידעי את הרופא.

פני לרופא או לרוקח ליעוץ לפני נטילת תרופה כלשהי.

נהיגה ושימוש במכוונת

לג'ובונטי אין כל השפעה או שיש לה השפעה זניחה על היכולת לנהוג ולהשתמש במכוונת.

מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה

ג'ובונטי מכילה סורביטול

תרופה זו מכילה 47 מיליגרם סורביטול בכל מ"ל של תמיסה.

ג'ובונטי מכילה פוליסורבט

תרופה זו מכילה 0.1 מ"ג פוליסורבט 20 בכל מ"ל של תמיסה.

פוליסורבטים עלולים לגרום לתגובות אלרגיות. ספר לרופא אם ידוע לך שאתה סובל מאלרגיה כלשהי.

ג'ובונטי מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) ב-60 מ"ג (1 מ"ל תמיסה), כלומר במהותה 'נטולת נתרן'.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לדבוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המומלץ הוא 60 מ"ג הניתנים פעם בששה חודשים כדריקה בודדת מתחת לעור (תת עורית) באמצעות מזרק מוכן לשימוש אחד.

האזורים הטובים ביותר להזרקה הם החלק העליון של הירכיים והבטן. המטפל יכול גם להזריק לאזור החיצוני של הזרוע העליונה.

אנא היועץ ברופא לגבי התאריך האפשרי להזרקה הבאה. עלון ג'ובונטי מכיל כרטיס תזכורת, אשר ניתן להסיר ולהתחלק בו כדי לתעד את תאריך ההזרקה הבא.

עליך לקחת גם ויטמין D ותוספי סידן בזמן שאתה מקבל טיפול בג'ובונטי. הרופא ישוחח על כך איתך.

הרופא עשוי להחליט שהדבר הטוב ביותר הוא שאתה או המטפל שלך זריקו לך ג'ובונטי. הרופא או איש צוות רפואי יראו לך או למטפל כיצד להשתמש בג'ובונטי. להוראות איך להזריק לג'ובונטי, אנא קרא את החלק המופיע בסוף העלון.

אין לעבור על המנה המומלצת.

ג'ובונטי צריכה להינתן תחת האחריות של איש מקצוע רפואי.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

בית חולים והבא ארזית התרופה איתך.
אם נטלת מנת יתר מן התרופה, פנה מייד לרופא או לאחד מיון של

אם שכתת לקחת את התרופה

אם החמצת מנות ג'ובונטי, יש לקבל את הזריקה בהקדם האפשרי. לאחר מכן, לוח זמני הזריקות ייקבע כל 6 חודשים מתאריך הזריקה האחרונה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק לטיפול ג'ובונטי

כדי להפיק את מרב התועלת מהטיפול בהפחתת הסיכון לשברים, חשוב להשתמש בג'ובונטי כל משך החזון. פחיתות רשם אותה. אל תפסיק את הטיפול לפני שפנית לרופא.

הפסקת שימוש בג'ובונטי עלולה להעלות את הסיכון לשברים בעצמות עמוד השדרה, במיוחד במטופלים עם רקע של שברים בעצמות עמוד השדרה. אל תפסיק לקחת ג'ובונטי מבלי ששוחחת לפני כן עם הרופא. אם הטיפול בג'ובונטי מופסק, שוחח עם הרופא על אפשרויות טיפול זמינות אחרות.

אין לזרקה תרופות בחושרן! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בג'ובונטי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

בטיחות נמוכה, מטופלים המקבלים ג'ובונטי עלולים לפתח זיהומים בעור (בעיקר דלקת רקמה תת-עורית (צלוליטיס)). **אנא פנה מייד לרופא** אם אתה מפתח אחד מהתסמינים האלה בזמן שאתה מקבל טיפול בג'ובונטי: אזור אדמומי ונפוח בעור, בדרך כלל בחלק התחתון של הרגל, שתייה בו גרישות ותחושת חום, וייתכן שילווה בתסמינים של חום.

לעיתים נדירות, מטופלים המקבלים ג'ובונטי עלולים לפתח כאב בפה ו/או בלוסת, נפיחות או פצעים שאינם מחלים בפה או בלוסת, הפרשה, חוסר תחושה או תחושת כבדות בלוסת, או התרופותיש לש.ן.
אלו יכולים להיות סימנים של נזק לעצם הלסת (נמק בעצם). **פנה מייד לרופא ולרופא שיניים** אם אתה חווה תסמינים כאלה כשאתה מקבל טיפול בג'ובונטי או לאחר הפסקת טיפול.

לעיתים נדירות, למטופלים המקבלים ג'ובונטי עלולות להיות רמות סידן נמוכות בדם (היפוקלצמיה); רמות נמוכות של סידן בדם בדרגה חמורה עלולות להוביל לאשפוז ואף עשויות להיות מסכנות חיים. התסמינים כוללים התכווצויות או עוויתות בשרירים ו/או חוסר תחושה או עקצוץ באצבעות הידיים, בהונות הרגליים או סביב לפה ו/או התקפים, בלבול או איבוד הכרה. אם אחד מאלו מתייחס אליך, **פנה לרופא מייד**. סידן נמוך בדם עלול להוביל גם לשינוי בקצב לב הנקרא הארכת QT, שנראה בבדיקת אלקטרוקרדיוגרם (אק"ג).

לעיתים נדירות שברים חריגים בעצם הירך עלולים להתרחש במטופלים המקבלים ג'ובונטי. **צור קשר עם הרופא** אם אתה חווה כאב חדש או חריג באגן, במפשעה או בירך מאחר שזה יכול להיות סימן מוקדם לשבר אפשרי בעצם הירך.

לעיתים נדירות, תגובות אלרגיות עלולות להתרחש במטופלים המקבלים ג'ובונטי. התסמינים כוללים נפיחות של הפנים, שפתיים, לשון, גרון או חלקי גוף אחרים; פריחה, גרד או חרלת (במשויות מגרדות) בעור, צפצוף או קושי בנשימה. **אנא ספר לרופא** אם אתה מפתח אחד מתסמינים אלו בזמן הטיפול בג'ובונטי.

תופעות לוואי שכוחות מאוד (עלולות להופיע ביותר מ-1 מכל 10 אנשים):

- כאב בעצם, במפרק ו/או בשיריר לעיתים חמור,
- כאב בזרוע או ברגל (כאב בגפיים).

תופעות לוואי שכוחות (עלולות להופיע ב-עד 1 מכל 10 אנשים):

- כאבים בדרך שותן, דחפיות במתן שותן, דם בשתן, חוסר יכולת להתאפק,
- זיהום מותני העליונות,
- כאב, עקצוץ או חוסר תחושה במורד הרגל (איטיטיקה),
- עצירות,
- חוסר נוחות בבטן,
- פריחה,
- מצב בעור הכולל גרד, אדמומיות ו/או יובש (אקזמה),
- נשירת שער (אלופציה).

תופעות לוואי נדירות מאוד (עלולות להופיע ב-עד 1 מכל 100 אנשים):

- חום, אדמום וחוסר נוחות או כאב בבטן (דיברטיקוליטיס, דלקת במע),
- זיהום באוזן,
- פריחה העשויה להופיע על העור או פצעים בפה (פריחה ליכנואידיית בעקבות שימוש בתרופות),

- שבירים בעצמות עמוד השדרה לאחר הפסקת ג'ובונטי (multiple vertebral fractures).

תופעות לוואי נדירות מאוד (עלולות להופיע ב-עד 1 מכל 10,000 אנשים):

- תגובה אלרגית העלולה לפגוע בכלי דם בעיקר בעור (כגון כתמים בגוון סגול או חום-אדום, חרלת [סרפדת] או פצעים בעור) (hypersensitivity vasculitis).

תופעות לוואי בשכוחות לא ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- דבר עם הרופא אם יש לך כאב אוזניים, הפרשה מהאוזן ו/או דלקת אוזניים. אלו יכולים להיות סימנים של פגיעה בעצמות באוזן.
- תגובה אלרגית חמורה (תגובה לתרופה עם אאוזינופיליה ותסמינים מערכתיים [סידנרם IDRESS]) עם פריחה בעור/שלפוחיות, חום ו/או עלייה בטוסיים של תאי דם לבנים (אאוזינופיליה) עם נזק אפשרי ללאיברים כליתי או ריאות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה ממועדת הלוואי מתמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרנה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דייווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דייווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי". שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדייווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il/

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ארייתה של ילדים ו/או תינוקות ועוד ילדי כגן תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

שייכן נחוצות עוד. זה יסייע להגן על הסביבה.

תנאי אחסון:

יש לאחסן במקרר (2°C–8°C).

אין להקפיא.

אין לנער.

יש לשמור באריזת הקרטון החיצונית על מנת להגן מפני אור.

ניתן להשאיר את האריזה עם המזרק המוכן לשימוש מחוץ למקרר על מנת שגייע למטפרטרות החדר (עד 25°C) לפני הזרקה. כך ההזרקה תהיה נוחה יותר. לאחר שהמזרק המוכן לשימוש הושאר מחוץ למקרר על מנת שגייע למטפרטרות החדר (עד 25°C), יש להשתמש בו בתוך 30 ימים.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

sorbitol, acetic acid glacial, polysorbate 20, sodium hydroxide, hydrochloric acid and water for injections

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

מזרק מוכן לשימוש עם תמיסה סטרילית להזרקה, צלולה עד מעט חלבית, חסרת צבע עד מעט צהבהבה או מעט חומה.

אריזה של ג'ובונטי מכילה מזרק אחד מוכן לשימוש עם מגן מחט.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו:

סנדוז פרמצבטיקה ישראל בע"מ, ת.ד. 9015, תל אביב, ישראל.

נערך בפברואר 2025.


מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-38243-84-178
לשם הפיטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלישון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות שימוש"

"הוראות שימוש" אלה מכילות מידע כיצד להזריק את ג'ובונטי.

אם הרופאה/ש שלכם מחליט שבאפשרותכם או באפשרות המטפלת שלכם להזריק את זריקת ג'ובונטי שלכם בבית, דואו כי הרופאה/ו האחות/ולם שלכם מראים לכם או למטפלת/ת שלכם כיצד להכין את מזרק ג'ובונטי המוכן לשימוש וניצד להזריק באמצעותו, לפני שאתם משתמשים בו בפעם הראשונה.

הקפידו לקרוא ולהבין את הוראות השימוש האלה לפני הזרקה עם מזרק ג'ובונטי המוכן לשימוש. שוחחו עם הרופאה/ש שלכם אם יש לכם שאלות.



מידע חשוב שיש לדעת לפני הזרקת ג'ובונטי

- ג'ובונטי מיועד להזרקה תת-עורית בלבד (הזרקה ישירה לשכבה השומנית מתחת לעור).
- אין להשתמש במזרק המוכן לשימוש אם אחד מאטמי הבטיחות שעל הקרטון החיצוני או האטם של מגש הפלסטיק שבורים.
- אין לנער** בשום זמן שהוא את המזרק המוכן לשימוש.
- אין להשתמש במזרק המוכן לשימוש אם הוא נפל על משטח קשיח או אם הוא נפל לאחור הסרת מכסה המחט.**
- למזרק המוכן לשימוש יש מגן בטיחות שמטרתו לנסות את המחט לאחר סיום ההזרקה. מגן הבטיחות מסייע במניעת פציעות מדקירת המחט לכל מי שמטפל במזרק המוכן לשימוש לאחר ההזרקה.
- יש להיזהר שלא לגעת בכנפי הבטיחות** לפני השימוש. נגיעה בהן עלולה לגרום למגן הבטיחות להיפתח מוקדם מדי.
- אין לנסות לעשות שימוש חוזר או לפרק את המזרק המוכן לשימוש.**
- אין למשוך** לאחור את הבוכנה.

אחסון מזרק ג'ובונטי

- יש לאחסן במקרר בטמפרטורה של 2-8 מעלות צלזיוס.
- אין להקפיא** את המזרק.
- במידת הצורך, ניתן לאחסן את המזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר של עד 25 מעלות צלזיוס למשך עד 30 יום.
- יש לזרוק את המזרק המוכן לשימוש שאוחסן בטמפרטורת החדר לאחר 30 יום.
- יש לשמור את המזרק המוכן לשימוש בקרטון המקורי עד השימוש על מנת להגן עליו מפני אור.
- יש להרחיק את המזרק מטווח הראייה ומהישג ידם של ילדים