

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

لانوكسين TM إكسبير 0.05 ملغ /مل

يحتوي كل 1 مل من لانوكسين إكسبير على **0.05 ملغ ديجوكسين (Digoxin)**.

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية" في النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجل: لا تعطي للأخريين. فهو قد يضرهم حتى ولو بد لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. إذا ظهرت لديك أعراض جانبية، بما في ذلك أعراض جانبية لم تتكرر في هذه النشرة في الفقرة 4، بلغ الطبيب أو الصيدلي.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لانوكسين إكسبير مخصص عندما يتطلب الأمر استعمال الديجيتاليس لعلاج قصور القلب، الرجفان الأذيني و/أو فرقة وتسرع القلب فوق البطيني.

الفصلية العلاجية: من الفليكويزيدات القلبية.

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال لانوكسين إكسبير إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة ديجوكسين، لفليكويزيدات قلبية أخرى أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" في النشرة)
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في القلب، مثل مشاكل في توصيل الإشارات الكهربائية في القلب، خاصة إذا وجدت لديك سابقة لنوبات ستوكس - أدامز (فقدان مفاجئ، وموقت للوعي ناجم عن تغير مفاجئ في نظم القلب).
- كنت تعاني من نبض غير منتظم ناجم عن تسمم غليكوزيدي قلبي أو حالات مثل متلازمة وولف - باركينسون - وايت.
- كنت تعاني من إعتلال عضلة القلب الإسنادي (ضخم عضلة القلب).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال لانوكسين إكسبير

قبل العلاج بـ لانوكسين إكسبير، إحك الطبيب إذا:

- كنت تتناول هذا الدواء، يمكن أن يطلب منك الطبيب إجراء فحوص دم روتينية من أجل تحديد كمية الديجوكسين في الدم. يمكن أن يكون ذلك مفيداً في حالة المرضى الذين يعانون من مشاكل كلوية.
- تطور لديهم تسمم بالديجوكسين، قد يؤدي ذلك إلى حالات مختلفة من اضطرابات نظم القلب، التي جزء منها يشبه اضطرابات نظم القلب التي من أجلها وُصف هذا الدواء.
- وجد لديك عدم سلامة نظم القلب (إحصار القلب) وكن تتناول لانوكسين إكسبير. توجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من اضطرابات منظم القلب، التي قد تشمل: إغماء، فقدان الوعي لمدة قصيرة، دوام أو تهور، إنباح (إرقاق)، ضيق في التنفس، آلام في الصدر، نبض غير منتظم أو إرتباك.
- وجد لديك اضطراب تواصل جيبى أذيني (اضطراب في توصيل الإشارات الكهربائية في القلب، مثل متلازمة "العقدة الجيبية المريضة")، لدى بعض المتعالجين الذين يعانون من اضطراب

تواصل جيبى أذيني، قد يؤدي هذا الدواء إلى نبض بطيء و/أو غير منتظم. قد يؤدي هذا أحياناً إلى إرقاق، ضعف ودوار وعندما يكون النبض لديك بطيئاً جداً فقد يغمى عليك.

• ناهيت مؤخراً من نوبة قلبية.

• وجدت قصور القلب بمشاركة تراكم بروتين غير سليم في نسج القلب (الداء النشواني القلبي). من شأن الطبيب أن يصف لك علاجاً بدلاً.

• كنت تعاني من التهاب عضلة القلب (myocarditis)، قد يؤدي ذلك في حالات نادرة لتضييق أوعية دموية. من شأن طبيبك أن يصف لك دواء مختلفاً.

• وجد لديك مرض بري بري (ناجم عن نقص في فيتامين B1). وجد لديك التهاب التامور الضيق (constrictive pericarditis) (التهاب الغشاء الذي يلف القلب).

• كنت تتناول مدرات بولية (أدوية التي تشجع على إنتاج البول) وتساهم في خفض كمية الماء في جسمك)، مع أو بدون مثبت ACE (أدوية التي تستعمل بشكل لأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم). سوف يصف طبيبك مقداراً دوائياً منخفضاً أكثر من

لانوكسين إكسبير. لا يجوز التوقف عن تناول لانوكسين إكسبير بدون إشراف الطبيب.

• لديك فحص قلب الذي يسمى التخطيط الكهربائي للقلب (electrocardiogram)، أخبر الشخص الذي يجري لك الفحص بذلك تتناول لانوكسين إكسبير لأن ذلك يمكن أن يؤثر على تحليل النتائج.

• كنت تعاني من مرض ضحير في الطرق التنفسية (الربوئين)، (لأنه من الجائز بأن لديك حساسية زائدة لـ لانوكسين إكسبير).

• كنت تعاني من انخفاض نسبة الألبومين التي تصل إلى أجزاء معينة من جسمك، انخفاض نسب اليوسايوم، انخفاض نسب المغنيزيوم بشكل شاذ، أو ارتفاع نسب الكالسيوم في الدم.

• كنت تعاني من مرض في الغدة الدرقية (مثل قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية) لأنه من الجائز أن تتحاج إلى تغييرات في المقدار الدوائي للدواء.

• كنت تعاني من متلازمة سوء الإمتصاص (لا يمكنك إمتصاص العمان من الطعام بشكل سليم) أو إذا إجتزت ذات مرة عملية جراحية لترميم الجهاز الهضمي.

• كنت مقيلاً على تلقي علاج بواسطة الكهرباء لتصحيح عدم إنتظام نبض القلب.

• إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت إحدى الحالات المدونة إعلاه تنطبق عليك، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي عن ذلك قبل بدء تناول لانوكسين إكسبير.

الفحوص والمتابعة

يمكن أن يطلب منك الطبيب إجراء فحوص دم روتينية من أجل تحديد كمية الديجوكسين في الدم.

التفاعلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك بالأخص إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

• يمكن أن تزداد الحساسية لـ لانوكسين إكسبير جراء استعمال أدوية تقلل من نسبة اليوسايوم في الدم. هذه الأدوية تشمل:

• مدرات بولية

• أملاح الليثيوم (مضادات الاكتئاب)

• مستحضرات على أساس الكورتيكوستيروئيدات

• كاربينوكسولون (مستحضر لنقوية العضلات المحاطية للمعدة)

الأدوية التالية ترفع نسبة لانوكسين إكسبير في الدم، الأمر الذي قد يزيد من خطورة حدوث سمية:

- أدوية معينة التي تؤثر على القلب: أمودارون، فليكاتانينيد، برازوسين، بروپرفينون، كينيدين
- كاناجيلفوزين (لعلاج السكري من نوع 2)

• مضادات حيوية معينة: إيريتروميسين، كلاريثروميسين، تتراسيكلين، جينتاميسين، تريموثوبريم

• داكلاتاسيفر، سيميبريفير، فلباتاسيفر (بمشاركة أدوية أخرى لعلاج التهاب الكبد C)

• فليفاينيرين (لعلاج दर्تي الرغبة الجنسية لدى النساء اللواتي لم يجتزن من اليأس)

• أدوية لعلاج التوتوات الفطرية (إيسافوكانازول، إيتراكونازول، بوساكونازول)

• إيفاكافور (لعلاج التليف الكيسي)

• سيبرونولاكتون (دواء يزيد من كمية البول التي تنتجها) • فيرازولام (أدوية مهدئة يمكن إستعمالها لعلاج القلق)

• إيندوميثاسين (لعلاج التهاب)

• كينيد (بالإمكان إستعماله للوقاية من ثلوث الملاريا)

• بروفينيتيل (لمنع التشنجات العضلية)

• ميريابجرون (لعلاج فرط نشاط المثانة البولية الذي يؤدي إلى دافع مفاجئ في التبول وجراة ذلك إلى سلس البول اللاإرادي)

• فيغازولون (مضاد للإكتئاب)

• أتورفاستاتين (لخفض الكولسترول في الدم)

• سيكلوسبورين (لثبيط الجهاز المناعي، يستعمل في أحيان متقاربة لمنع رفض أعضاء مزروعة)

• إيبوبروستينول (لعلاج فرط ضغط الدم الرئوي)

• توفابياتان وكوفيتافان (لعلاج انخفاض نسب الصوديوم في الدم)

• كارفيديول (لعلاج قصور طفيف حتى شديد في القلب وفرط ضغط الدم)

• رينوتوافير (لعلاج ثلوث HIV والإيدز)

• تيلزابيرفير (لعلاج ثلوث التهاب الكبد C)

• رورونيدول (لعلاج عدم إنتظام النبض)

• زونلانيول وتيتاميل (لعلاج الآلام في الصدر)

• ليتيميسارتان (لعلاج فرط ضغط الدم)

• أدوية لعلاج السرطان (لاپاتينيب، فاندناتينيب، فيمورافينيب، أوسيميرتينيب)

• تيكابجولير (لمنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية)

• فيراياميل وفيلوذيبيين (لعلاج فرط ضغط الدم)

• ميثبات P- جليكوبروتين

• فينيتويل (لعلاج مرضى عيانون من ابيضاض الدم اللينفاوي المزمن)

• مثبتات مضخة البروتون (PPIs) [لتخفيف من أعراض الإرتداد الحمضي، أو لعلاج الإرتداد المعدي المريئي (GERD)]

الأدوية التالية يمكن أن ترفع أو لا تؤثر على نسبة لانوكسين إكسبير في الدم:

• نيفيديبين، ديلتيازام، حجابات المستقل أنجيوتنسين (ARBs)

• ومثبات ACE (لعلاج فرط ضغط الدم وقصور القلب)

• أدوية مضادة للالتهاب الالتهاب الستيروئيدية (NSAIDs) (مثبتات

الإنزيم سيكلاو أوكسيجيناز 2-COX-2) (لعلاج الآلام والتهابات

إذا كنت تعاني من قصور في القلب وكن تتناول مستحضرات

تحتوي على سنا [senosinoids) (زيادة كمية البراز، المساعدة

في حركة الأمعاء) سوية مع لانوكسين إكسبير، من الجائز أن يحدث

لديك ارتفاع معتدل في الخطورة لحدوث تسمم بـ لانوكسين إكسبير.

الأدوية التالية تقلل من نسبة لانوكسين إكسبير في الدم:

- أدوية مضادة الحموضة (لعلاج الحموضة في المعدة)
- مستحضرات مسهلة معينة التي تشكل حمماً (تزيد من كمية البراز المشكلة من أجل المساعدة في حركة الأمعاء)

• كاولين - بيكتين (لعلاج الإسهال)

• أكاربوس (لعلاج أنواع معينة من السكري)

• مضادات حيوية معينة: نيوميسين، بنيسيلامين، ريفامپيسين

• أدوية معينة سامة للخلايا (تستعمل كعلاج كيميائي لعلاج السرطان)

• ميتوكلوپراميد (لعلاج الغثيان والتقيؤات)

• سورفلازولين (دواء مضاد للأمراض الإنتهازية في الأمعاء)

• إنزولانين (لعلاج ردود فعل تحسسية خطيرة)

• سابوليمول (لعلاج الربو)

• كوليستيرامين (يقلل من نسب الكولسترول في الدم)

• فينيتويل (لعلاج الصرع)

• St. John's wort (العرن - هيبيريبيكوم بيريفوراتورم) (لعلاج الاكتئاب)

• بوبروبيون (لعلاج الاكتئاب)

• محفزات P- جليكوبروتين

• تغذية معينة مكملة (تغذية بواسطة أنبوب تغذية)

إذا كنت تتناول ديجوكسين سوية مع الأدوية التالية قد تكون معرضاً لخطورة متزايدة لإرتفاع نسبة اليوسايوم في الدم:

• كالسيوم داخل الوريد

• حاجيات بيتا

• أدوية مقلدة للحملة الحمصية الودية (لعلاج نوبة قلبية وإنخفاض ضغط الدم)

إذا كنت تتناول لانوكسين إكسبير وسوكساميونيوم (الذي يستعمل لإرخاء العضلات ويعالج تشبة قصير الأمد)، من الجائز أنك معرض لخطورة متزايدة لإرتفاع نسبة اليوسايوم في الدم.

إستعمال الدواء والطعام

لا يمكن تناول هذا الدواء على معدة خاوية أو مع معظم وجبات الطعام.

من ذلك، يجب الإمتناع عن تناول لانوكسين إكسبير مع أغذية غنية بالياف، المسماة أيضاً "الياف غذائية"، لأن نسبة الـ لانوكسين إكسبير في مضمخها الجسم يمكن أن تكون أقل.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

السؤال

هل يصف لك الطبيب هذا الدواء بحذر زائد خلال الحمل.

من الجائز أن تحتاجي مقداراً دوائياً أكبر من الدواء إذا كنت حاملاً.

يمكن أن يعطى هذا الدواء إلى الأم خلال إرتفاع نظم القلب بشكل شاذ وقصور القلب لدى الجنين.

الأعراض الجانبية للعلاج بـ لانوكسين إكسبير التي تؤثر على الأم

يمكن أن تؤثر أيضاً على الجنين.

الإرضاع

يُحظر هذا الدواء في حليب الأم، لكن بكميات قليلة جداً، لذا، يمكن للنساء المرضعات إستعمال هذا الدواء.

الخصوبة

لا تتوفر معلومات بخصوص تأثير لانوكسين إكسبير على الخصوبة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، فتعديني بذلك حمل أو تخططين للحمل.

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء.

الإستعمال المماكتات

بما أنه بلغ عن دوار، تشوش في الرؤية ورؤية بلون أصفر خلال

العلاج بـ لانوكسين إكسبير، يجب السيقية، تشغيل المماكتات أو

المشاركة بنشاطات خطيرة بحذر بالغ.

يحتوي لانوكسين إكسبر على ميتيل برا هيدروكسي بنزوات، سوكروز، إيثانول و صوديوم. **ميتيل برا هيدروكسي بنزوات:** قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية (من الجائز أن تظهر بعد فترة زمنية ما).

سكرين:

يحتوي لانوكسين إكسبر على أقل من 0.3 غرام سكروز في كل 1 مل ملحوظ. على 1.5 غرام سكروز في مقداروائي قدره 5 مل (0.25 مل ديجوكسين). تعتبر كمية السكروز أقل للمقدار الإيثانول، إذا وجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يجب إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء. توجه إلى الطبيب لتلقي توضيح إضافي إذا كان طفلك يتناول الدواء. قد يلحق الدواء الضرر بالأسنان.

إيثانول:

يحتوي لانوكسين إكسبر على أقل من 0.1 مل إيثانول (مقدار في كل مل من الدواء أي حتى 0.44 غرام إيثانول في كل 1 مل من قدره 5 مل (0.25 مل ديجوكسين). الذي يعادل أقل من 12.5 مل (أقل من 3 مل صغرة صغيرة) بيعة، أقل من 4.5 مل (أقل من ملقة واحدة صغرة) نبيذ للمقداروائي قدره 0.25 مل ديجوكسين. تعتبر كمية الإيثانول وفقاً للمقدار الدوائي. توجه لطبيبك لتوضيح إضافي إذا كان طفلك يتناول الدواء. بعض الدواء يهوله النين يعاون من الإدمان على الكحول. يجب أخذ ذلك بعين الإعتبار لدى النساء الحوامل. النساء المرضعات، الأطفال والفتات اللذين يخطرون عالية، مرضى صغار يعاونون من أمراض في الكبد أو من مرض الصرع. **الصوديوم:**

كبار الأطفال فوق عمر 16 سنوات، يحتوي لانوكسين إكسبر على 38.019 ملغ صوديوم (المركب الأساسي على الطبخ) أو أقل للمقدار الدوائي. هذا يعادل ما قيمته 1.9% من الإستهلاك الغذائي الأممي الصودي على به من الصوديوم لشخص بالغ.

● طفله دون عمر 16 سنوات: لانوكسين إكسبر على أقل من 1 ميليغرام صوديوم (23 ملغ) في 1 مل من الدواء، الذي يعتبر "خال من الصوديوم".

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيفاض من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة الإستعمال، والمستحضر، المقدار الدوائي وطريقة العلاج بحدادن من قبل الطبيب فقط؛ يتعلق المقدار الدوائي بالمشكلة القلبية التي تعاني منها وعن شدتها.

● يتعلق المقدار الدوائي أيضاً بعمر، وزنك وبالآداء الوظيفي الكلوي.

● خلال تناول الدواء، سوف يرشك الطبيب بإجراء فحوص دوروية من أجل التحقق من إستجابتك ل لانوكسين إكسبر.

● يتم ملامة المقدار الدوائي من قبل طبيبك بناء على نتائج فحوص الدم وإستجابتك للعلاج. لذا عليك المواظبة بدقة على العلاج الذي حدده الطبيب.

● إذا كنت تتناول أو تناولت في الأسبوعين الأخيرين دواءً آخرًا من فصيلة الجليكوزيدات القلبية، من الجائز أن يلائم لك الطبيب مقداراً دوائياً منخفضاً أكثر.

● إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أقوى مما ينبغي أو أضعف مما ينبغي، توجه إلى الطبيب.

طريقة تناول الدواء

- لانوكسين إكسبر عبارة عن محلول للشرب للتناول عبر الفم.
- يتوفر لانوكسين إكسبر مع قفازات دندرجات، يجب إستعمالها لقياس كمية المقدار الدوائية.
- يجب الحرص على قياس المقدار الدوائي بواسطة القفازة المرققة بالدواء.

طريقة تناول الدواء

عادة يتم تناول الدواء على مرحلتين:

- **المرحلة 1 - المقدار الدوائي التحصيلي**
يوصل المقدار الدوائي التحصيلي نسبة ل لانوكسين إكسبر لديك بسرعة إلى النسبة الصحيحة في الدم، بواحدة من ثلاثا طريقتين:
 - ستلقى مقداراً دوائياً وحباً كبيراً و من ثم ستبدأ بتلقي المقدار الدوائي الداعم الأصغر بك أو
 - ستلقى مقداراً دوائياً أقل كل يوم لمدة أسبوع وما من ثم تبدأ بتلقي المقدار الدوائي الداعم الخاص بك.
- **المرحلة 2 - المقدار الدوائي الداعم**
بعد تناول المقدار الدوائي التحصيلي ستوجد عليك تناول مقدار دوائي أقل بكثير كل يوم، حتى يصدر لك الطبيب تعليمات بالتوقف.

أطفال ومرافقون فوق عمر 10 سنوات

- مقدار دوائي تحصيلي
- عادة مقدار دوائي وحيد قدره 1.5-0.75 ملغ. بالنسبة لمرضى معينين سيعطى هذا المقدار الدوائي بمقادير دوائية تتفاوت بفاصل زمني قدره 6 ساعات.
- بدلاً من ذلك، تتناول مقدار دوائي قدره 0.75-0.25 ملغ كل يوم لمدة أسبوع.
- مقدار دوائي داعم
- سوف يقرر طبيبك بخصوص المقدار الدوائي، كأمر متعلق بإستجابتك ل لانوكسين إكسبر.
- عادة مقدار دوائي قدره 0.25-0.125 ملغ كل ليوم.

أطفال دون عمر 10 سنوات

- مقدار دوائي تحصيلي
- يجب حسابه وفقاً لوزن الطفل.
- عادة مقدار دوائي قدره 0.045-0.025 ملغ/كغ وزن جسم.
- يعطى هذا المقدار الدوائي بمقادير دوائية مقسمة بفاواصل زمنية ما بين 4 إلى 8 ساعات.
- مقدار دوائي داعم
- سوف يقرر الطبيب بخصوص المقدار الدوائي، كأمر متعلق بإستجابته لذلك ل لانوكسين إكسبر.
- عادة 1/5 (أخس) أو 1/4 (ربع) المقدار الدوائي التحصيلي، الذي يتم تناوله مرة في اليوم.

المسنون

من شأن المسنون تلقي مقدار دوائي منخفض أكثر من المقدار الدوائي الإعتيادي الخاص بالكبار. لأنه من الجائز أن لدى المسنين تراجع في الأداء الوظيفي الكلوي. سوف يخصص الطبيب نسبة ل لانوكسين إكسبر في دمك ومن الجائز أن يغير المقدار الدوائي الخاص بك عند الحاجة.

● لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به من قبل الطبيب.

● إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر
إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى أو لمرکز التسمم وذلك من أجل تقييم المخاطر والصعود على المعلومات وأضرب معك علبة الدواء.

إن الأمراض الأساسية للتسمم بالديجوكسين هي إضطراب في نظم القلب وأعراض الجهاز الهضمي التي يمكن أن تظهر قبل الإضطرابات في نظم القلب. أعراض الجهاز الهضمي تشمل: فقدان الشهية للطعام، غثيان وتقيؤات.

● أعراض أخرى للتسمم بالديجوكسين تشمل: دوام، إنهاك، شعور عام بوعكة وإضطرابات عصبية مختلفة، بما في ذلك إضطرابات في الرؤية (رؤية أكثر صفراء - خضراء من المعتاد)، أعراض العصبية والأعراض التي تتعلق بالرؤية قد تظهر أيضاً بعد زوال علامات أخرى للتسمم. من حالة التسمم المزمن، من الجائز أن تكون الإنهاك التي لا تتعلق بالقلب، مثل ضعف وتعب عام بوعكة، هي الأعراض الأساسية.

● إذا نسيت تناول الدواء في الموعد المحدد، فلا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي واستشر الطبيب. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

سوف يصدر لك طبيبك تعليمات لكم من الوقت عليك تناول لانوكسين إكسبر. لا يجوز التوقف عن العلاج بالبداء بدون إستشارة الطبيب.

● يجب تناول الأدوية في **العمدة!** يجب تحديد **مطابق** الدواء **والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها** دواء. **عند النظرات الطبية إذا لم أزر ألك كمر.**

● إذا توقفت لدا أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، **استشر الطبيب أو الصيدلي.**

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال لانوكسين إكسبر قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض الأشخاص. لا تتدش من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز ألا تعاني أي منها.

● **عليك التوجه فوراً إلى طبيب مختص أو التوجه لتلقي إستشارة طبية طارئة إذا أظهرت العلامات التالية:**

● أعراض جانبية نادرة جداً (**very rare**) - (تظهر لدى أقل من 1 مستعمل واحد من بين 10,000 مستعمل)

● ضربات قلب، ألم في الصدر، ضيق في التنفس أو تورق. يمكن أن تكون هذه أعراض لمشكلة خطيرة في القلب التي تنجم عن ضربات قلب جديدة وغير منتظمة.

● أعراض جانبية إضافية يمكن أن تشمل:

● أعراض جانبية شائعة (**common**) - (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين)

● قد تحدث ردود فعل تحسسية جلدية (طفح، شرى)

● عدم إنتظام النبض

● غثيان، تقيؤات، إسهال

● إضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، مثل دوام

● إضطرابات في الرؤية (تضوش الرؤية أو رؤية بلون أضر)

● أعراض جانبية غير شائعة (**uncommon**) - (تظهر لدى أقل من 1 مستعمل واحد من بين 100 مستعمل)

● إكتئاب

● أعراض جانبية نادرة جداً (**very rare**) - (تظهر لدى أقل من 1 مستعمل واحد من بين 10,000 مستعمل)

● إختفاض في كمية الصفائح الدموية (الأعراض تشمل كدمات ورنع)

● فقدان الشهية للطعام (فهم)

● زهان، لا ميلابة (**apathy**) إرتباك

● صداع

● الألام في البطن ناجمة عن نقص في التزويد بالدم أو تضرب

● الأمعاء (إفطار ونخر (**Acrocrosis**))

● تضخم نسج الشدي لدى الرجال (**gynecomastia**)

● قلة حيوية (إنهاك)، شعور عام بوعكة وصف

● **التهاب عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.**

● **التبليغ عن أعراض جانبية:**
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة النسخة المودجة على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة" دوائي "الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)" الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.au/

● بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس بواسطة العنوان التالي: **Padaqis.co.uk**

● **(5) كيفية تخزين الدواء؟**
تحتفظ بالتسمم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأر الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقاص الصلاحية (**exp. date**)، يظهر على ظهر تاريخ الكرتون والفقسية، يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من التقيد.

● يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

● دفع الفوتية للمرة الأولى، بالإمكان إستعمال المستحضر لمدة 12 يوماً بما لا يتجاوز تاريخ إنتقاص صلاحية الدواء، الأقرب من بينها.

● لا يجوز إلقاء الأدوية في البحاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

● **(6) معلومات إضافية**
يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:

Purified Water, Disodium Phosphate Anhydrous, Methyl Parahydroxybenzoate, Citric Acid Monohydrate, Syrup, Quinoline Yellow E104 (Colour), Ethanol, Propylene Glycol, Lime Flavour.

● كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة:
إن لانوكسين إكسبر عبارة عن سائل أصفر بمذاق الليمون، مائل عذ من قنبلة زجاجية داكنة تحتوي على 60 ملل من السائل على غطاء بلاستيكي. تحتوي كل قنبلة معبأة ضمن صلب كرتون على قفازة.

● **صاحب الإمتياز وعنوانه:** وكالات باداجيس إسرائيل م.ض. شارع راكيفيت 1، شوهام.

● **إسالم المنتج وعنوانه:** أسين باد أولسدول GmbH. باد أولسدول، ألمانيا.

● تم إعدادها في آذار 2025.

● رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 126.96.30673.

● من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بلغة الجذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.