



**בלינסייטו (BLINCYTO)
בלינאטומומאב blinatumomab
מידע חשוב עבור מטופלים ומטפלים
על מזעור סיכונים**

פורמט חוברת זו ותוכנה נבדקו ואושרו
על ידי משרד הבריאות באוקטובר 2021



חוברת הדרכה למטופלים ולמטפלים

בלינסייטו (BLINCYTO) בלינאטומומאב מידע חשוב עבור מטופלים ומטפלים על מזעור סיכונים

פורמט חוברת זו ותוכנה נבדקו ואושרו על ידי משרד הבריאות באוקטובר 2021

מידע בחוברת הדרכה זו לא נועד להוות תחליף לשיחה עם הרופא שלך או עם בעלי מקצוע אחרים בתחום הבריאות המטפלים בך בלוקמיה לימפובלסטית חריפה. קרא את העלון לצרכן ואת חוברת ההדרכה הזו. במידה ויהיו לך שאלות כלשהן על בלינסייטו, אנא שוחח עם הרופא המטפל או עם האחיות או עיין בעלון לצרכן באתר של משרד הבריאות.

חוברת הדרכה זו נועדה למטופלים ומטפלים בבלינסייטו על מנת לספק מידע נוסף אודות

מזעור או מניעת הסיכונים הבאים הקשורים לטיפול בבלינסייטו:

- תופעות נוירולוגיות
- טעויות בטיפול תרופתי

ניתן לדווח למשרד הבריאות על אירועים חריגים באמצעות כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

או לדווח לחברת מדיסון (מפיצת התכשיר בישראל): pv@Medison.co.il

תוכן העיניינים

1	סקירת הטיפול בבלינסייטו	4
4	מהי בלינסייטו?	4
4	למה משמשת בלינסייטו?	4
4	כיצד ניתנת בלינסייטו	4
2	דברים חשובים שעליך ו/או בני משפחה/המטפל שלך לדעת על השימוש בבלינסייטו	5
2.1	מידע חשוב על תופעות נירולוגיות	5
2.2	מידע חשוב על טעויות בטיפול תרופתי	5

1 סקירת הטיפול בבלינסייטו

מהי בלינסייטו?

בלינסייטו היא תרופה שפועלת באמצעות כך שהיא מאפשרת למערכת החיסון שלך לתקוף ולהשמיד את תאי הדם הלבנים הסרטניים הבלתי תקינים.

למה משמשת בלינסייטו?

- בלינסייטו מיועדת לטיפול במבוגרים וילדים (≤ 1 שנה) ומתבגרים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה של B-cell precursor.
- לוקמיה לימפובלסטית חריפה של B-cell precursor היא סרטן של מח העצם ושל הדם, שבו סוג מסוים של תאי דם לבנים, הנקראים "לימפוציטים מסוג B" מתרבים ללא שליטה.
- בלינסייטו משמשת לטיפול כאשר לוקמיה לימפובלסטית חריפה של B-cell precursor חזרה או לא הגיבה לטיפול קודם (כלומר לוקמיה לימפובלסטית חריפה חוזרת/עמידה).
- בלינסייטו משמשת גם לטיפול במבוגרים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה של B-cell precursor שעדיין יש להם מספר קטן של תאים סרטניים שנותרו לאחר הטיפול הקודם (המכונה שארית מחלה מנימאלית).

כיצד ניתנת בלינסייטו?

- בלינסייטו ניתנת כעירוי תוך ורידי רציף:
- על מנת למקסם את התועלת של בלינסייטו יש לתת אותה למטופלים באופן רציף. לשם כך בלינסייטו ניתנת דרך וריד (מתן תוך ורידי) ברציפות באמצעות משאבת עירוי.
- (צנתר העירוי יהיה מוצמד אליך כל הזמן במהלך כל מחזור הטיפול שלך.
- הרופא שלך ישוחח עמך על משך האשפוז שלך, מספר ומשך מחזורי הטיפול הנחוצים לטיפול שלך בבלינסייטו.
- הרופא שלך יקבע מתי תוחלף שקית עירוי הבלינסייטו שלך, והתדירות יכולה לנוע בין כל יום לבין פעם בארבעה ימים.
- בלינסייטו ישאר פעיל בגופך למשך מספר שעות.

2 דברים חשובים שעליך ו/או בני משפחה/המטפל שלך לדעת על השימוש בבלינסייטו

2.1 מידע חשוב על תופעות ניורולוגיות

- בלינסייטו יכולה לגרום לתופעות ניורולוגיות הכוללות:
 - רעד (או טרמור) • בלבול • הפרעות בפעילות המוחית (אנצפלופתיה)
 - קושי לתקשר (אפאזיה) • פרכוסים (עוויתות).
- התקשר מיד לרופא או לאחות שלך אם תחוה את התסמינים האלה.
- חזור הביתה בבטחה ואסור לך לנהוג או להפעיל רכבים נעים/ מכונות כבדות או לעסוק בפעילויות מסוכנות בזמן קבלת בלינסייטו.

2.2 מידע חשוב על טעויות בטיפול תרופתי

- תמיסת התרופה בלינסייטו תינתן בעירוי לווריד. המשאבה תהיה מחוברת אליך 24 שעות ביממה למשך 28 ימים.
- חשוב שהאינפוזיה תינתן כמתואר על ידי איש צוות הרפואי שלך כדי למנוע טעויות בטיפול התרופתי ולהבטיח שקיבלת את הכמות הנכונה של בלינסייטו.
- כדי למנוע טעויות בטיפול התרופתי, חשוב לזכור את הדברים הבאים:
 - אין לפתוח, לנתק או לשנות הגדרות של משאבת העירוי
 - אם האזעקה של משאבת העירוי תפעל, או אם היא תפסיק לפעול, צור מיד קשר עם הרופא או עם האחיות שלך.
 - אין לשכב על הצינור, למשוך את הצינור או לתת לצינורות להסתבך או להתפתל. שמור על הכיסוי באתר העירוי יבש בכל עת.
 - אם יש לך חששות כלשהם בנוגע לאופן פעולת המשאבה שלך, פנה לרופא או לאחות שלך.

