



بلىنسايتو (BLINCYTO)
بلىناتوموماب blinatumomab
معلومات هامة للمتعالجين
والمعالجين حول تقليل المخاطر

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه الكراسة ومحتواها فُحص ورُخص من
قبلها في تشرين الأول 2021

بلينسايتو (BLINCYTO) بليناتوموماب معلومات هامة للمتعالجين والمعالجين حول تقليل المخاطر

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه الكراسة ومحتواها فحص ورخص من قبلها في تشرين الأول 2021

المعلومات في كراسة الإرشاد هذه لم تُخصص لكي تشكل بديلاً للحوار مع طبيبك أو مع أصحاب مهنة آخرين في مجال الصحة الذين يعالجوك من مرض إبيضاض الدم الأرومي اللمفي الحاد. إقرأ النشرة للمستهلك وكراسة الإرشاد هذه. إذا توفرت لديك أية أسئلة عن بلينسايتو، الرجاء التحدث مع الطبيب المعالج أو مع الممرضات أو إقرأ بتمعن نشرة المستهلك في موقع وزارة الصحة.

كراسة الإرشاد هذه مخصصة للمتعالجين والمعالجين بـ بلينسايتو من أجل توفير معلومات إضافية حول تقليل أو تفادي المخاطر التالية المتعلقة بالعلاج بـ بلينسايتو:

- أعراض عصبية
- أخطاء في العلاج الدوائي

بالإمكان التبليغ لوزارة الصحة عن الحوادث الشاذة بواسطة تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>
أو تبليغ شركة مديسون (موزعة المستحضر في إسرائيل): pv@Medison.co.il

الفهرس

- 1** لمححة عن العلاج بـ بلينسايتو _____ **4**
- 4** ما هو بلينسايتو؟ _____
- 4** لأي غرض مخصص بلينسايتو؟ _____
- 4** كيف يُعطى بلينسايتو؟ _____
- 2** أمور هامة يتوجب عليك و/أو على أفراد عائلتك/الذي يعتني بك معرفتها حول
إستعمال بلينسايتو _____ **5**
- 2.1** معلومات هامة عن أعراض عصبية _____ **5**
- 2.2** معلومات هامة عن أخطاء في العلاج الدوائي _____ **5**

1 لمحة عن العلاج بـ بلينسايتو

ما هو بلينسايتو؟

بلينسايتو هو دواء يعمل عن طريق تمكين جهازك المناعي من مهاجمة وإتلاف خلايا الدم البيضاء السرطانية غير الطبيعية.

لأي غرض يستعمل بلينسايتو؟

- بلينسايتو مخصص لمعالجة كبار وأطفال (≤ 1 سنة) ومراهقين لديهم مرض إبيضاض الدم الأرومي اللمفي الحاد لـ B-cell precursor.
- إن إبيضاض الدم الأرومي اللمفي الحاد لـ B-cell precursor هو سرطان في النخاع العظمي وفي الدم، حيث يتم فيه تكاثر نوع معين من خلايا الدم البيضاء، المُسماة "لمفاويات من نوع B" من دون سيطرة.
- يستعمل بلينسايتو للعلاج عند عودة إبيضاض الدم الأرومي اللمفي الحاد لـ B-cell precursor أو عدم استجابته لعلاج سابق (أي إبيضاض الدم الأرومي اللمفي الحاد المتكرر/المقاوم).
- يستعمل بلينسايتو أيضاً لعلاج الكبار الذين يعانون من إبيضاض الدم الأرومي اللمفي الحاد لـ B-cell precursor الذين لا يزال لديهم عدد قليل من الخلايا السرطانية التي تلبقت بعد العلاج السابق (المُسمى الحد الأدنى من بقايا المرض).

كيف يعطى بلينسايتو؟

- يُعطى بلينسايتو على شكل تسريب متواصل عبر الوريد:
- من أجل تحقيق أعلى قدر من الفائدة من بلينسايتو يجب إعطائه للمتعالجين بشكل متواصل. لهذا يُعطى بلينسايتو عبر الوريد (بالإعطاء الوريدي) بشكل متواصل بواسطة مضخة التسريب.
- (قطر التسريب يكون مرفق إليك طوال الوقت خلال كامل دورة العلاج الخاصة بك).
- يتحدث معك طبيبك حول مدة مبيتك في المستشفى، عدد ومدة دورات العلاج الضرورية لعلاجك بواسطة بلينسايتو.
- يحدد طبيبك متى يجب تبديل كيس تسريب الـ بلينسايتو الخاص بك، والوتيرة يمكن أن تتراوح بين كل يوم وبين مرة خلال أربعة أيام.
- يبقى بلينسايتو نشطاً في جسمك لمدة عدة ساعات.

2 أمور هامة يتوجب عليك و/أو على أفراد عائلتك/الذي يعتني بك معرفتها حول إستعمال بلينسايتو

2.1 معلومات هامة عن الأعراض العصبية

- قد يسبب بلينسايتو أعراضاً عصبية التي تشمل:
- إرتجاف (أو tremor) • إرتباك • اضطرابات في النشاط الدماغي (encephalopathy)
- صعوبة في التواصل (aphasia) • إختلاجات (تشنجات).

- إتصل فوراً بالطبيب أو بالمرضة الخاصة بك إذا قاسيت من هذه الأعراض.
- عد إلى البيت بأمان ويحظر عليك سيطرة أو تشغيل المركبات المتحركة/الماكنات الثقيلة أو القيام بنشاطات خطيرة خلال فترة تلقي بلينسايتو.

2.2 معلومات هامة عن أخطاء في العلاج الدوائي

- يُعطى محلول الدواء بلينسايتو بالتسريب للوريد. ستكون المضخة موصولة بك 24 ساعة خلال الليل والنهار لمدة 28 يوماً.
- من المهم أن يُعطى التسريب كما هو موصوف من قبل فرد الطاقم الطبي الخاص بك لتجنب وقوع أخطاء في العلاج الدوائي وضمان تلقيك الكمية الصحيحة من بلينسايتو.

- لتجنب وقوع أخطاء في العلاج الدوائي، فمن المهم تذكر الأشياء التالية:
- لا يجوز فتح، فصل أو تغيير إعدادات مضخة التسريب
- إذا تم تفعيل الإنذار في مضخة التسريب، أو إذا توقف عن العمل، إتصل فوراً بالطبيب أو بالمرضة الخاصة بك.
- لا يجوز الإضطجاع على الأنبوب، شد الأنبوب أو السماح للأنابيب بالتشابك أو بالإلتواء. حافظ على بقاء غطاء منطقة التسريب جافاً طوال الوقت.
- إذا وُجدت لديك أية شكوك بخصوص كيفية عمل المضخة الخاصة بك، فتوجه للطبيب أو للممرضة الخاصة بك.

