

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986**

קרא / בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

**פיטודרם® קומפוזיטום**

משחה

**הרכב**

Tolnaftate	1%
Salicylic acid	3%
Benzoic acid	6%

מרכיבים בלתי פעילים:

Butylated hydroxytoluene, white petrolatum, polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 4000.

**קבוצה תרופית**

Tolnaftate - קוטל פיטריות.  
Salicylic acid - גורם לקילוף העור.  
Benzoic acid - נוגד פטריות.

**פעילות רפואית**

טיפול מקומי במחלות עור פטריות במצבים בהם קיים גם צורך בקילוף העור.

**מתי אין להשתמש בתכשיר ?**

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.  
אין להשתמש במשחה זו על עור פצוע, מגורה או מודלק או על כתמי לידה או שומות.  
התכשיר אינו מומלץ לטיפול בזיהומים בציפורניים או בקרקפת.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

אם הינך בהריון או מניקה, או אם הינך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד כלי דם או סכרת.

**אזהרות**

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא או אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ובמיוחד לסליצילטים.

אין לתת לתכשיר לבוא במגע עם העיניים, במקרה של מגע יש לשטוף מיד עם מים.  
אם לא חל שיפור אחרי 10 ימים או במקרה ומחלת העור מחמירה, יש להפסיק את הטיפול ולהיוועץ ברופא.

**תגובות בין-תרופתיות**

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם רופא או תוספי תזונה, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

**תופעות לוואי**

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון צריבה קלה.

**תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת**

תגובה אלרגית, גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:**

יש לרחוץ ולייבש היטב את האיזור הנגוע לפני מריחת המשחה.  
מרח/י את המשחה על השטח הנגוע 2-3 פעמים ביום.  
אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל שנתיים.

**שים/י לב**

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד!  
יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים ורקמות ריריות (כגון בפה ובאף).

\*\*\*\*\*

**\* כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול? \***

\*\*\*\*\*

לחות מעודדת את צמיחת הפטריות, לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע. יש לרחוץ האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. בין טיפול לטיפול במשחה ניתן להשתמש באבקת טלק או אבקה נגד פטריות כדי לייבש את המקום. אם הטיפול הוא ברגליים- יש להקפיד על רחיצה וייבוש יסודיים, במיוחד בין אצבעות הרגליים. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה; יש להימנע מלבוש גרביים מצמר או מחומרים סינתטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה). בעונות המתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.

**מנעי הרעלה!**

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך. אל תגרם/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא !  
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

**החסנה**

יש לשמור תרופה זו מתחת ל- 25°C  
גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' רישום התרופה: 00 20178 66 052**

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,  
ת"ד 3190, פתח תקוה.