

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986**  
**يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط**

**أبسترال 400 مكغ**  
**أبسترال 600 مكغ**  
**أبسترال 800 مكغ**

**أبسترال 100 مكغ**  
**أبسترال 200 مكغ**  
**أبسترال 300 مكغ**

**أقراص للأخذ تحت اللسان**

**التركيب:**

كل قرص يحتوي على:

المادة الفعالة وكيفيتها:

أبسترال 100 مكغ: فنتаниل (كتسيترات) 100 mcg  
أبسترال 200 مكغ: فنتаниل (كتسيترات) 200 mcg  
أبسترال 300 مكغ: فنتаниل (كتسيترات) 300 mcg  
أبسترال 400 مكغ: فنتаниل (كتسيترات) 400 mcg  
أبسترال 600 مكغ: فنتаниل (كتسيترات) 600 mcg  
أبسترال 800 مكغ: فنتаниل (كتسيترات) 800 mcg

**مواد غير فعالة ومسبيات حساسية:** انظر بند 6 في النشرة: "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بأمعان حتى نهايتها قبل البدء باستعمال الدواء. هذه النشرة تحتوي على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء وصف لك. لا تعطه لآخرين فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن مرضهم مماثل. الدواء مخصص للبالغين فوق جيل 18.

- تناول هذا الدواء مع أدوية من فصيلة البنزوديازيبينات، أدوية أخرى مثبطة لجهاز الأعصاب المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو كحول قد يسبب الشعور بالنعاس العميق، صعوبات في التنفس (خmod تنفس)، غيبوبة وموت.
- قد تؤدي الأدوية من عائلة الأفيونيات للإدمان، بالأساس عند الاستعمال المتواصل، وهي ذات امكانية لاستعمال سيء ولجرعة مفرطة. قد يتجلّى رد فعل لجرعة مفرطة بتنفس بطيء وحتى التسبب بموت. تأكّد بأنك تعرّف اسم الدواء، الجرعة التي تأخذها، وتيرة الإعطاء، مدة العلاج، الأعراض الجانبية والاختطرات الممكنة. معلومات إضافية: بخصوص الاختصار لتعلق وإدمان يمكن إيجادها في الرابط:

[https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids\\_he.pdf](https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf)

**1. لأي غرض مخصص الدواء؟**

أبسترال مخصص لعلاج الألم الاختراقي لدى مرضى السرطان الذين يعالجون بأدوية قوية لتسكن الأوجاع (أفيونيات) بشكل ثابت.

الألم الاختراقي هو ألم يظهر بشكل مفاجئ، بالرغم من أنك تستعمل مسكنات آلام أفيونية بشكل ثابت.

**الفصيلة العلاجية:** المادة الفعالة بأقراص أبسترال للأخذ تحت اللسان هي فنتаниل. فنتаниل ينتمي لمجموعة أدوية مخدرة قوية تستعمل لتسكن الآلام والتي تسمى أفيونيات.

**2. قبل استعمال الدواء**

**☒ لا يجوز استعمال الدواء:**

- إذا كنت حساساً (لديك حساسية) للمادة الفعالة فنتаниل أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في بند 6).

إذا كنت تعاني من مشاكل وخيمة في التنفس.

- إذا كنت لا تستعمل بشكل ثابت أدوية تستلزم وصفة طبيب من نوع أفيون يومياً وفي أوقات ثابتة لمدة أسبوع على الأقل للسيطرة على المك المتواصل (على سبيل المثال أدوية أفيونية مثل: كودائين، فنتаниل، هيدرومورفون، مورفين)

- أوكسيكودون، فتيدين). إذا لم تكن تستعمل دواء من هذا النوع، لا يجوز لك استعمال أبستراال لأن الدواء قد يرفع الاختطار لتنفس بطيء وأو سطحي بشكل خطير، أو لانقطاع النفس.
- إذا كنت تعاني من ألم قصير الأمد مختلف عن الألم الآخرافي.
  - إذا كنت تتلقى العلاج بواسطة دواء يحتوي على أوكسيبات الصوديوم.

## ! تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

خزن هذا الدواء في مكان مغلق وآمن، بحيث لا يمكن للأخرين الوصول إليه (المعلومات إضافية انظر البند 5 كيف يخزن الدواء).

- أخبر طبيبك أو الصيدلي قبل العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الحالات التالية، لأن طبيبك سيحتاج للأخذ بالاعتبار هذه المعلومات لملائمة الجرعة من أجلك:
- اصابة في الرأس، لأن أبستراال يمكن أن يحجب مدى خطورة الإصابة.
  - مشاكل في التنفس أو إذا كنت تعاني من مرض ضعف العضلات (مياستينيا غرافيس).
  - إذا كنت تعاني من مشاكل قلب وخاصة إذا كنت تعاني من نظم قلب بطيء.
  - ضغط دم منخفض.
  - مرض في الكبد أو الكلى، قد يتوجب على طبيبك أن يلائم الجرعة بمزيد من الحذر.
  - ورم في الدماغ و/أو ارتفاع بالضغط داخل الجمجمة (ارتفاع الضغط في الدماغ الذي يسبب آلام شديدة في الرأس، غثيان/نقيؤ وضبابية في الرؤية).
  - تقرحات في الفم أو التهاب في الغشاء المخاطي للفم (انتفاخ واحمرار بتجويف الفم).
  - إذا كنت تتناول أدوية ضد الاكتئاب أو الذهان، إقرأ بامتعان البند التالي "أدوية أخرى وأبستراال".
  - إذا تطور لديك في إحدى المرات قصور كلوبي أو نقص في الهرمونات الجنسية (نقص في الإندروجين) مع استعمال الأفيونات.

- في فترة العلاج بأبستراال، عليك إبلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول هذا الدواء، إذا:
- كنت تنوی الشخص لعملية جراحية أياً كانت.
  - إذا كنت تعاني من ألم أو حساسية متزايدة للألم (hyperalgesia) والذين لا يستجيبان لمقدار دوائي أكبر من الدواء كما حدد ذلك من قبل الطبيب.
  - كنت تعاني من الأعراض التالية مجتمعة: غثيان، نقيؤ، فقدان الشهية للطعام (anorexia)، إرهاق، ضعف، دوار وانخفاض ضغط الدم. دمج الأعراض التالية قد يشكل مؤشراً لحالة خطر ممكّن على الحياة، والتي تسمى قصور الغدة الكظرية، وهي حالة التي لا تنتج فيها الغدد الكظرية قدرًا كافياً من الهرمونات.

**الاستعمال والتحمّل على المدى الطويل**  
يحتوي هذا الدواء على فنتانيل وهو دواء أفيوني. من شأن الاستعمال المتكرر لمسكّنات الآلام الأفيونية أن يؤدي إلى تراجع فاعلية الدواء (تعتاد على الدواء)، الأمر الذي يسمى تحمل الأدوية). كذلك، قد تكون أكثر حساسية للألم أثناء استعمال أبستراال. وهذه الظاهرة معروفة باسم فرط التألم. قد تساعد زيادة جرعة أبستراال في تقليل الألم لفترة ما، لكنها قد تسبب الضرر أيضاً. إذا لاحظت أن فاعلية الدواء قلت، تحدث مع الطبيب. سيقرر الطبيب إن كان من المفضل زيادة الجرعة أو تقليل استعمال أبستراال تدريجياً.

**التعلق والإدمان**  
قد يؤدي استعمال أبستراال المتكرر إلى التعلق، سواء الاستعمال والإدمان، ما قد يؤدي لجرعة مرتفعة تشكّل خطرًا على الحياة. قد تزداد خطورة هذه الأعراض الجانبية مع جرعة أعلى ومدة استعمال أطول. قد يسبب التعلق أو الإدمان شعوراً بأنك لم تعد تسيطر على كمية الدواء التي تحتاجها أو بأي وسيلة يجب عليك استعماله. قد تشعر بأنك تحتاج لمواصلة استعمال الدواء، حتى عندما لا يكون استعماله مفيداً لك في تخفيف الألم.

- يختلف خطر حصول التعلق أو الإدمان من شخص لآخر. قد تكون لديك خطورة أكبر لأن تصاب بالتعلق أو أن تصبح مدمناً على أبستراال إذا:
- استخدمت أنت أو أحد أفراد عائلتك، في أي وقت، كمية مفرطة أو كان لديك تعلق بالكحول، الأدوية بوصفه طيبة أو المخدرات غير القانونية ("إدمان").
  - كنت تدخن.
  - كانت لديك مشاكل في المزاج (اكتئاب، هلع أو اضطراب في الشخصية) أو تلقّيت العلاج لدى طبيب نفسى بسبب أمراض نفسية أخرى.

إذا لاحظت إحدى العلامات التالية أثناء استعمال أبستراول، فقد يكون هذا مؤشراً على أنك أصبحت متعلقاً بالدواء أو أدمنت عليه:

- كان عليك استعمال الدواء لفترة زمنية أطول مما أوصى به طبيبك
- كان عليك استعمال جرعة أكبر من الموصى بها
- كنت تستعمل الدواء لأسباب المهددة، مثلاً، لكي "تبقى هادئاً" أو "المساعدتك في النوم".
- قفت بمحاولات متكررة، لم تنجح، التوقف عن، أو السيطرة على استعمال الدواء.
- عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر بسوء (مثلاً، حالات الغثيان، حالات التقيؤ، حالات الإسهال، حالات الهلع، حالات القشعريرة، الرجفة والعرق)، وتشعر بصورة أفضل عند معاودة استعمال الدواء ("أعراض الفطام").

إذا لاحظت إحدى العلامات المذكورة، تحدث مع طبيبك لمناقشة أفضل مسار علاجي لك، بما في ذلك متى سيكون من الصحيح التوقف وكيفية التوقف بصورة آمنة.

### مشاكل تنفسية تتعلق بالنوم

قد يسبب أبستراول مشاكل تنفسية تتعلق بالنوم، مثل انقطاع التنفس خلال النوم (توقف النفس خلال النوم) نقص التأكسج خلال النوم (مستوى أوكسجين منخفض في الدم). قد تكون الأعراض: توقف التنفس خلال النوم، الاستيقاظ في الليل نتيجة لضيق التنفس، صعوبة في موافقة النوم أو نعاس متواصل خلال النهار. إذا لاحظت أنت أو أي شخص آخر هذه الأعراض، توجه للطبيب. قد ينكر الطبيب بخضير الجرعة.

**أدوية أخرى وأبستراول**  
إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى تشمل الأدوية التي تباع بدون وصفة طبيب ومكملاً غذائياً، أبلغ بذلك الطبيب أو الصيدلي.

بعض الأدوية قد تزيد أو تنقص من تأثيرات أبستراول. لذلك أخبر الطبيب إذا كنت على وشك البدء بالعلاج، تغيير الجرعة أو وقف العلاج بالأدوية التالية لأنه قد يتوجب على الطبيب ملائمة جرعة أبستراول:

- أدوية مضادة للفطريات المستعملة لعلاج العدوى الفطرية، مثل كيتوكونازول أو إيتراكونازول.
- مضادات حيوية من مجموعة الماكروليدات المستعملة لعلاج العدوى، مثل إيريثروميسين.
- أدوية مضادة للفيروسات التابعة لعائلة مثبطات الأنزيم بروتياز المستعملة لعلاج التلوثات الناجمة عن الفيروسات - مثل ريتونافير.

ريفامبين أو ريفابوتين (أدوية المستعملة لعلاج تلوثات بكتيرية).  
كاربامازيبين، فينيتوين أو فينوباربิตال (أدوية المستعملة لعلاج الاختلالات/الصرع).  
أدوية من مصدر نباتي تحتوي هيبيريكوم [St John's wort (*Hypericum perforatum*)].  
أدوية تحتوي على گحول.  
أدوية من عائلة مثبطات الأنزيم مونوامين أوكتيداز (MAOI)، المستعملة لعلاج الاكتئاب الوخيم ومرض باركنسون. أبلغ طبيبك إذا تناولت دواء من هذا النوع خلال الأسبوعين الأخيرين.  
أنواع معينة من مسكنات الآلام القوية، تسمى محاكيات أو مثبطات جزئية مثل بوبيريلوزفين، نيلوفين وفينتزوتسين. من الممكن أن تشعر بأعراض متلازمة الفطام (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال، فلق، قشعريرة، رجفة وعرق) خلال استعمال هذه الأدوية.

قد يزيد أبستراول من التأثير المُنْوَم للأدوية التالية (أدوية مهدئة) وأيضاً زيادة الإختثار (احتمال الخطر) لخmod تنفسى وانخفاض ضغط الدم:

أدوية أخرى لتسكين الآلام القوية (أدوية من عائلة الأفيونيات لتسكين الآلام أو السعال)  
بعض مسكنات الآلام العصبية (جابابنتين وبريجابالين)  
أدوية للتخدير العام (المُعدة للتخدير خلال العمليات الجراحية)  
أدوية مرخية للعضلات  
أدوية منومة  
أدوية لعلاج:  
» الاكتئاب  
» الحساسية (مضادات هيستامين منومه معيقات H1)  
» قلق وذهان (أدوية من عائلة الباربيتورات، بنزوديازيبينات، مثل ديزابيبام، أدوية منومة أو مضادة للقلق)  
أدوية تحتوي على كلوردين (العلاج ارتفاع ضغط الدم)

يزيد استعمال أبسترال بموازاة استعمال أدوية تسبب لك الشعور بالنعاس (أدوية مهدئة) مثل البنزوديازيبينات من مخاطر النعاس، صعوبات التنفس (تشييط التنفس)، الغيبوبة، كما قد يشكل خطراً على الحياة. لذلك، يجب التفكير باستعمال أبسترال مع أدوية مهدئة فقط عندما لا تكون هناك إمكانيات علاج أخرى.

لكن إذا قرر الطبيب، رغم ذلك، استعمال أبسترال مع أدوية مهدئة، فيجب أن يقوم الطبيب بتحديد الجرعة وفترة الاستعمال.

الرجاء إخبار الطبيب بأي دواء مهدئ تتناوله، والالتزام بالجرعة التي أوصاك بها الطبيب بدقة. قد يكون من المفيد إخبار الأصدقاء أو الأقارب ليكونوا على علم بالعلامات والأعراض المفصلة أعلاه. اتصل بالطبيب عندما تشعر بأي من هذه الأعراض.

يزداد الاختصار لأعراض جانبية معينة أخرى إذا كنت تتناول أدوية مثل مضادات اكتئاب أو مضادة للذهان، لأنه يُحتمل تفاعل بين الأدوية المماثلة بتغيرات في الوضع النفسي [على سبيل المثال تهيج (عدم هدوء)، هلوسة، غيبوبة]، وأعراض أخرى مثل سخونة مرتفعة فوق 38 درجة مئوية، ارتفاع بنظم القلب، ضغط دم غير مستقر ومتغيرات معززة، تصلب عضلات، فلة تنسيق وأعراض في الجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤات، إسهال). في هذه الحالة، سينصحك الطبيب إذا كان أبسترال ملائماً لك.

**استعمال الدواء بالتزامن مع الغذاء والشراب**  
قد يزيد عصير الچريبي فروت من خطر الأعراض الجانبية لأبسترال لذلك يمنع شرب عصير الچريبي فروت خلال فترة العلاج بأبسترال.

**استعمال الدواء وتناول الكحول**  
قد يسبب أبسترال النعاس لدى مرضى معينين. لا يجوز استهلاك الكحول أثناء العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب لأنه من الممكن أن يسبب النعاس المفرط.

## **الحمل والإرضاع**

لا يجوز استعمال أبسترال إذا كنت حاملاً، إلا إذا قيل غير ذلك من قبل الطبيب بشكل صريح لأن فتاتنيل ممكن أن يسبب أعراض القهقحة عند المولود ويشكل خطراً على حياته.

لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بأبسترال، ولا يجوز بدء الإرضاع قبل مرور على الأقل 5 أيام على الجرعة الأخيرة من أبسترال. قد ينتقل فتاتنيل لحليب الأم ومن الممكن أن يسبب نعاساً وخموداً تنفسياً لدى الطفل الرضيع.  
إذا كنت حاملاً أو مُرْضِعَةً يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الأدوية.

## **السيارة واستعمال الآلات**

قد يضر أبسترال بقدرتك النفسية و/أو الجسدية على تنفيذ مهام ذات احتطرار محتمل مثل السيارة أو تشغيل آلات.  
إذا كنت تشعر بالدوار، ضبابية بالرؤية أثناء استعمال أبسترال، لا يجوز قيادة المركبة أو تشغيل آلات.

## **أبسترال يحتوي على الصوديوم**

يحتوي الدواء على أقل من 1 mmol (23 ملг) للقرص، مما يعني أنه عملياً خالي من الصوديوم.

## **3. كيف تستعمل الدواء؟**

قبل بدء العلاج بأبسترال سيسيرح لك طبيبك كيف عليك أن تتناول أبسترال للحصول على تخفيف ناجع للألم الاختراقي.

قبل بدء العلاج، وبصورة دائمة أثناء العلاج، سيناقش معك طبيبك أيضاً ما الذي عليك توقيعه من استعمال أبسترال، متى وكل من الوقت عليك تناوله، متى يجب مراجعة طبيبك ومتي عليك وقف الاستعمال (انظر البند 2).

يجب استعمال الدواء دائمًا وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.  
المستحضر معد لاستعمالك فقط بحسب تعليمات طبيبك. المستحضر منوع للاستعمال من قبل شخص آخر غيرك، لأنه من الممكن أن يشكل خطراً وخيمَا على الصحة، خاصةً لدى الأطفال.  
أبسترال هو دواء مختلف عن أدوية أخرى قد تكون تناولتها بالماضي لعلاج الألم الاختراقي. دائمًا يجب تناول أبسترال بالجرعة التي حددت لك من قبل طبيبك – قد تكون هذه الجرعة مختلفة عن الجرعة لأدوية أخرى كنت قد تناولتها بالماضي لعلاج الألم الاختراقي.  
الجرعة وطريقة الاستعمال يحددان من قبل طبيبك فقط. الجرعة الاعتيادية عادة هي:

### **بداية العلاج - إيجاد الجرعة الأكثر ملائمة**

لكي يعمل أبسترال بنجاعة، على الطبيب أن يحدد الجرعة الأكثر ملائمة لعلاج المك الاختراقي. يُسوق أبسترال بعدة جرعات. ممكن أن يطلب منك أن تُجري جرعات مختلفة من أبسترال لفترة عدة نوبات من الألم الاختراقي لإيجاد الجرعة الأكثر ملائمة لك. طبيبك سيساعدك على ذلك وسيوجهك كيف تجد قوة القرص الأكثر ملائمة لك.  
إذا لم تشعر بتحسن الألم بشكل كافٍ بعد جرعة واحدة، من الممكن أن يرشدك طبيبك لتناول جرعة إضافية لعلاج نوبة الألم الاختراقي.

لا يجوز تناول جرعة إضافية، إلا إذا أمرك طبيبك بذلك، لأن هذا الشيء من الممكن أن يؤدي إلى استهلاك جرعة زائدة.

من الممكن أن يأمرك الطبيب أن تتناول جرعة تحتوي على أكثر من قرص واحد على التوالي. يمكن القيام بذلك فقط إذا أمرك الطبيب بذلك بشكل صريح.

يجب الانتظار ساعتين على الأقل من تناول الجرعة الأخيرة من أبسترال وحتى تناول الجرعة القادمة لعلاج نوبة إضافية من الألم الاختراقي.

**جرعة المداومة (استكمال العلاج)** - بعد أن تم إيجاد الجرعة الأكثر ملائمة لك في اللحظة التي وجدت أنك وطبيبك جرعة الأبسترال التي تحكم بألمك الاختراقي، لا يجوز تناول هذه الجرعة أكثر من أربع مرات في اليوم. قد تكون جرعة أبسترال مؤلفة من أكثر من قرص واحد.  
يجب الانتظار ساعتين على الأقل من تناول جرعة الأبسترال الأخيرة وقبل تناول الجرعة القادمة لعلاج نوبة إضافية من الألم الاختراقي.

إذا كانت جرعة الأبسترال التي تتناولها لا تتحكم بألمك الاختراقي بشكل كافٍ، بحسب رأيك، أخبر طبيبك، فقد تكون هناك حاجة لملاعبة الجرعة من جديد.

لا يجوز تغيير جرعة أبسترال، إلا إذا قيل ذلك بشكل صريح من قبل الطبيب.  
لا يجوز تخطي الجرعة الموصى بها.

### **كيفية الاستعمال:**

أبسترال مُعد للاستعمال تحت اللسان. يجب وضع القرص تحت اللسان، حيث سيذوب بسرعة، وهكذا يتم امتصاص المادة الفعالة، فنتانيل، بالغشاء المخاطي للفم. عندما يتم امتصاصه، يبدأ فنتانيل بتسكين الأوجاع.

**عندما تعاني من ألم إختراقي، خذ الجرعة التي حددت من قبل طبيبك بالشكل التالي:**

- إذا كان فمك جافاً، تناول الماء لترطيبه. ممكن بصفة أو بلع الماء.

آخر القرص من لوبيحة الأقراص (البليستر) **فوراً** قبل الاستعمال على النحو التالي:

» إفصل واحداً من مربعات لوبيحة الأقراص (البليستر) عن طريق التمزيق على طول الخطوط الفاصلة (أترك باقي مربعات لوبيحة الأقراص (البليستر) مع بعض).

» قم بتنقشير طرف رقائق الألومنيوم باتجاه السهم المُعلَّم، وأخرج القرص بحذر. لا تحاول دفع القرص عن طريق غطاء الرقاقة، لأن هذا الشيء ممكِّن أن يضر به.

- ضع القرص تحت اللسان إلى الوراء قدر المستطاع حتى ذوبانه التام.

• سيدُوب أبسترال بسرعة تحت اللسان وسيُمتص لكي يخفف من الألم.

لا يجوز مص، شطر، سحق، مضغ أو بلع القرص.

يجب وضع القرص بكامله تحت اللسان.

لا يجوز الشرب أو الأكل حتى الذوبان التام للقرص تحت اللسان.

### **إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة:**

• يجب إخراج بقايا الدواء فوراً من الفم.

• أخبر مُعالجك بذلك أو شخص آخر.

توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك. على مُرافق المريض أن يحافظ على يقطة المريض بواسطة التحدث معه أو هزه من حين إلى آخر.

قد تسبب الجرعة المفرطة أيضاً اضطراباً دماغياً يسمى اعتلال بيضاء الدماغ السمي.

### **أعراض الجرعة المفرطة تشمل:**

• نعاس استثنائي

• تنفس سطحي وبطيء

• غيبوبة

في حالة ظهور هذه الأعراض يجب استدعاء مساعدة طبية طارئة فوراً.

إذا تناول بالخطأ بالغ أو طفل من الدواء، يجب نقله فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ بالمستشفى وإحضار عبوة الدواء.

يجب المداومة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

### **إذا توقفت عن تناول الدواء**

إذا أصبحت لا تعاني من الألم الاختراقي، باستطاعتك إيقاف استعمال أبسترال لكن عليك الاستمرار باستعمال دوائلك الأنفيوني الثابت لمعالجة الألم المتواصل وفقاً لتعليمات طبيبك. إذا كنت تعاني من أعراض فُطام أو كنت قلقاً من تسكين المأك، عليك استشارة الطبيب. سينظر الطبيب فيما إذا كنت بحاجة لدواء لمعالجة أعراض الفُطام.

لا تتوقف عن تناول أبسترال دفعة واحدة، إلا إذا قال لك الطبيب القيام بذلك. إذا كنت ترغب بالتوقف عن تناول أبسترال، استشر طبيبك أولاً. سيقول لك كيف تقوم بذلك، عادةً من خلال تقليل الجرعة تدريجياً، لكي لا تشعر بأعراض غير لطيفة. إذا توقفت عن تناول أبسترال دفعة واحدة، قد تعاني من أعراض الفُطام (الانسحاب)، مثل: العصبية، الهلع، خفقان القلب، الرجفة أو التعرق.

لا يجوز تناول الأدوية **بالظلام!** تحقق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بما يخص استعمال الدواء، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

## **4. الأعراض الجانبية**

مثل أي دواء، قد يسبب استعمال هذا الدواء أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تصاب بأي واحدة منها.

- إذا كنت تشعر بالنعاس بشكل استثنائي أو غير عادي، أو إذا أصبح تنفسك بطيناً أو سطحياً، يجب التوجه فوراً للطبيب أو للمستشفى القريب لتلقي علاج طارئ (أنظر أيضاً الفصل 3 "إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة").
- أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):
- الغثيان

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- دوار، آلام رأس، نعاس زائد
- صداع في التنفس
- التهاب بتجويف الفم، تقيؤ، إمساك، جفاف في الفم
- تعرق، إنهاك/ تعب/قلة الطاقة

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):

- ردود فعل تحسسية (حساسية)، رجفة، اضطرابات بالرؤية أو ضبابية الرؤية، إبطاء أو تسارع نظم القلب، ضغط دم منخفض، فقدان الذاكرة
- اكتئاب، أفكار شوكوكية أو الشعور بالخوف بدون سبب، شعور بالارتباك، شعور بعدم الإدراك، شعور بقلق/فترة هدوء/حزن، شعور بالفرحة غير عادي (شميق)، تغيرات بالمزاج
- شعور متواصل بالامتلاء، ألم بالبطن، عسر الهضم (اضطراب بالمعدة)
- قرحات بالفم، مشاكل باللسان، ألم بالحلق، ضغط بالحلق، قرحات بالشفاه أو باللثة
- فقدان الشهية، فقدان أو تغير بحاسة الذوق/الشم
- صعوبة بالخلود إلى النوم أو اضطرابات بالنوم، قلة الانتباه/سهولة الشروق، قلة الطاقة/ضعف اضطرابات بالجلد، طفح جلدي، حكة، تعرق ليالي، انخفاض بحساسية اللمس، الميل للإصابة بسهولة
- ألم أو تصلب بالمفاصل، تصلب عضلات
- أعراض الفطام من المخدرات (مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، قلق، قشعريرة، رجفة، تعرق)، تناول جرعة مفرطة بالخطأ، لدى الرجال: عدم القدرة على الوصول/ أو المحافظة على الانتصاب، شعور عام غير جيد.

أعراض جانبية نسبة شيوخها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتم تحديد توادرها بعد):

- لسان منتفخ، مشاكل تنفس وخيمة، سقوط، أحمرار الوجه، شعور بالدفء المفرط، إسهال، إختلاجات (تشنجات)، انتفاخ اليدين أو الرجلين، رؤية أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع (هلوسة)، سخونة، انخفاض في مستوى الوعي أو فقدان الوعي، طفح مثير للحكمة وهذيان (أعراض قد تشمل هياج، قلة راحة، توهان، ارتباك، خوف، رؤية أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع، اضطرابات في النوم، كوابيس).
- تحمل الدواء، التعلق بالدواء (الإدمان)، إساءة استعمال الدواء (انظر البند 2)

قد يسبب الاستعمال المتواصل لـ فنتانيل خلال الحمل أعراض فطام لدى المولود والتي قد تشكل خطراً على الحياة (انظر البند 2).

#### **التبلیغ عن اعراض جانبية**

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبلیغ عن اعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترن特 للتبلیغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> كذلك، يمكن التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني لوحدة سلامة مُتلقي العلاج لدى صاحب التسجيل:

[drugsafety@neopharmgroup.com](mailto:drugsafety@neopharmgroup.com)

#### **5. كيف يخزن الدواء؟**

- تجنب التسمم! أبستراول هو دواء قوي جداً لتسكين الآلام قد يُشكل خطراً على الحياة إذا أخذ بالخطأ من قبل طفل. لذلك، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق ومغلق بعيداً عن متناول أيدي الآخرين، بما في ذلك الأطفال و/أو الرضع ونظرهم، وبذلك تمنع التسمم. قد يحصل ضرر خطير، بل وحتى قاتل للأشخاص الذين قد يتناولون هذا الدواء عن طريق الخطأ، أو عمداً دون أين يكون موصوفاً لهم.
- لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

- يُوصى بحفظ هذا الدواء بمكان مغلق.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة الخارجية واللوبيحة (البلاستر). تاريخ انتهاء الصلاحية يشير لليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25 درجة مئوية يجب التخزين في عبوة اللوبيحة (بلاستر) الأصلية للحماية من الرطوبة.
- كيف يتم التخلص من أقراص ليس لها استعمال؟ إذا تبقت لديك أقراص أبسترال ليس لها حاجة بعد، يجب إعطاؤها للصيدلية القريبة لكي يتم إتلافها بطريقه آمنة وبذلك المحافظة على البيئة. لا يجوز إلقاء الأدوية في المجاري أو القمامات البيئية.

## **6. معلومات إضافية**

- بالإضافة للمادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Mannitol (E421), Silicified microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate.

- **كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

أبسترال هو قرص أبيض صغير للأخذ تحت اللسان. القرص يأتي بقوة وأشكال مختلفة. سيفصف لك طبيبك القوة وعدد الأقراص الملائمة لك.

قرص أبسترال 100 مكغ هو قرص أبيض مستدير  
 قرص أبسترال 200 مكغ هو قرص أبيض بيضاوي الشكل  
 قرص أبسترال 300 مكغ هو قرص أبيض يشكل مثلث  
 قرص أبسترال 400 مكغ هو قرص أبيض يشكل جوهرة  
 قرص أبسترال 600 مكغ هو قرص أبيض يشكل الحرف "D"  
 قرص أبسترال 800 مكغ هو قرص أبيض يشكل كبسولة

يُسوق أبسترال بعبوات تحتوي 10 أو 30 قرصاً. الأقراص معبدة بلوبيحات (بلاسترات).

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

- **اسم صاحب التسجيل وعنوانه:** نيثوفارم م.ض، هشيلواج 6، ص.ب. 7063، بيتح تكفا 4917001.

**اسم المنتج وعنوانه:**  
 غرونتال م.ض، آخن، ألمانيا.

تم تحريرها في تشرين الأول 2025.

- **أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

أبسترال 100 مكغ 148 73 33262  
 أبسترال 200 مكغ 148 74 33263  
 أبسترال 300 مكغ 148 75 33264  
 أبسترال 400 مكغ 148 76 33265  
 أبسترال 600 مكغ 148 77 33266  
 أبسترال 800 مكغ 148 78 33267

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. لكن الدواء مخصوص لكلا الجنسين.

Abstral tabs PIL ver 01A