הודעה על החמרה (מידע בטיחות)

09.2011 תאריך

שם תכשיר באנגלית AMIODACORE INJ

מספר רישום מספר רישום

שם בעל הרישום sanofi aventis Israel ltd

השינויים בעלון מסומנים ברקע צהוב

עלון לרופא

פרטים על השינוי/ים המבוקש/ים		
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון
טקסט שהוסף מסומן (יש להדגיש כי מוזכר כאן רק המידע הנוסף, מידע מלא של סעיף זה ניתן למצוא בעלון המלא):		
Endocrine disorders (see section 4.8)		
Amiodarone IV may induce hyperthyroidism, particularly in patients with a personal history of thyroid disorders or patients who are taking/have previously taken oral amiodarone. Serum usTSH level should be measured when thyroid dysfunction is suspected.		Special warnings and
Amiodarone contains iodine and thus may interfere with radio-iodine uptake. However, thyroid function tests		precautions for
(free-T3, free-T4, usTSH) remain interpretable. Amiodarone inhibits peripheral conversion of levothyroxine (T4) to triiodothyronine (T3) and may cause isolated biochemical changes (increase in serum free-T4, free-T3 being slightly decreased or even normal) in clinically euthyroid patients. There is no reason in such cases to discontinue amiodarone treatment if there is no clinical or further biological (usTSH) evidence of thyroid disease.		use
טקסט שהוסף מסומן (יש להדגיש כי מוזכר כאן רק המידע הנוסף, מידע מלא של סעיף זה ניתן למצוא בעלון המלא):		
Endocrine disorders:		Undesirable
 Frequency not known: Hyperthyroidism (see section 4.4). 		effects
Musculoskeletal and Connective Tissue Disorders		
• Frequency not known: Back pain		