

הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לצרכן

(מעודכן 3102.50)

תאריך: 24/7/13

שם תכשיר באנגלית ומספר **Glycerin Supp (RN313825506)**
Glycerin Pediatric Supp (RN338125843)

שם בעל הרישום: **סם-און בע"מ**

טופס זה מיועד לפרוט החמרות בלבד !

ההחמרות המבוקשות

פרק בעלון	טקסט נוכחי	טקסט חדש
התוויות		
מתי אין להשתמש בתכשיר?	- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (גליצרין) או לאחר ממרכיבי התרופה האחרים. - במקרה של חסימת מעיים או חוסר תפקוד כרוני של המעיים.	- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (גליצרין) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים. - אין להשתמש בתכשיר משלשל אם לא הופיעה פעילות מעיים במשך יום אחד או יומיים. - אין להשתמש במקרה של אי ספיקת לב - אין להשתמש במקרה של דימום רקטלי בלתי מוסבר ובמקרה של חסימת מעיים או חוסר תפקוד כרוני של המעיים. - אין להשתמש במקרים של בחילות, הקאות, כאבי בטן - אין להשתמש במקרים של סימנים של דלקת התוספתן
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:		
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:	- את בהריון - אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב, מכאב בטן חזק, מדימום בפי הטבעת, מסימנים של דלקת התוספתן (כגון כאב בטן, בחילות והקאות בלתי מזוהים).	- את בהריון או מניקה - אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב ו/או כלי דם, מערכת העיכול - אם הבחנת בשינוי פתאומי בתדירות פעילות המעיים אשר מתמשך מעל לשבועיים
תגובות בין תרופתיות:		
הריון והנקה:	אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש אם הינך בהריון	אם את בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש
כיצד תשתמש בתרופה:		
תופעות לוואי:	השימוש בגליצרין עלול לגרום לתופעות לוואי כגון פריחה בעור יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם: אתה סובל מגירוי מקומי או דלקת.	השימוש בגליצרין עלול לגרום לתופעות לוואי כגון פריחה בעור, סחרחורת. יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם: - אתה סובל מפריחה מקומית או דלקת. - הופעת דימום רקטלי או העדר פעולת מעיים אחרי שימוש בתכשיר