



רופא/ה נכבד/ה  
רוקח/ת נכבד/ת

חברת תרו מבקשת להודיעכם כי העלון לצרכן של התכשיר **Dorzolamide Timolol** עודכן באוגוסט 2021.

השינויים העיקריים מסומנים מטה באדום, המחיקות סומנו בצבע כחול.

העלון המעודכן נשלח למשרד הבריאות לצורך פרסומו במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום:

תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור 14, ת.ד. 10347 מפרץ חיפה 2624761.

בברכה,  
מרינה גולדמן  
רוקחת ממונה

## Dorzolamide Timolol

מרכיב פעיל:

TIMOLOL ( AS MALEATE ) 5 MG/ML  
DORZOLAMIDE ( AS HYDROCHLORIDE ) 20 MG/ML

ההתוויה המאושרת לתכשיר:

For the treatment of elevated intraocular pressure (IOP) in patients with ocular hypertension, open-angle glaucoma, or other secondary open-angle glaucoma when concomitant therapy is appropriate.

**עדכונים עיקריים בעלון לצרכן:**

2. לפני שימוש בתרופה

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בדורזולאמיד טימולול תרו, ספר לרופא אם:

- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות רפואיות, כולל בעיות עיניים שיש לך עכשיו או שהיו לך בעבר:
- מחלת לב כלילית (התסמינים יכולים לכלול כאב או לחץ בחזה, קוצר נשימה או תחושת חנק), אי ספיקת לב, לחץ דם נמוך.
- הפרעות בקצב הלב, לדוגמה דופק איטי.
- ליקוי בתפקוד מערכת הנשימה כגון מחלת ריאות חסימתית כרונית, קלה עד בינונית.

...

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

...

- נוטל נוגדי-דיכאון הידועים גם בשם פלואוקסטין ופראוקסטין.
- נוטל תרופות מסוג סולפה.
- נוטל כינידין (משמש לטיפול במצבים מסוימים בלב ובמספר סוגים של מלריה).
- נוטל תרופות הגורמות לירידה ברמות הקטכולאמינים.
- נוטל קלונדין.
- זקוק לאפינפרין להזרקה (לדוגמה התכשיר אפיפן).

הרופא או הרוקח יוכלו לומר לך אם הינך נוטל אחת מן התרופות מהרשימה לעיל.

...

תרו אינטרנשיונל בע"מ

הקיטור 14,

ת.ד. 10347, מפרץ חיפה 2624761

טל: 04-8475700

פקס: 04-8727165

## מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- דורזולאמיד טימולול תרו מכיל את החומר המשמר בנזלקוניום כלוריד.  
- בנזלקוניום כלוריד עשוי להיספג בעדשות מגע רכות ולשנות את צבע עדשות המגע. עליך להסיר עדשות מגע לפני השימוש בתרופה ולהחזיר אותן 15 דקות לאחר מכן.  
- בנזלקוניום כלוריד עלול גם לגרום לגירוי בעיניים, במיוחד אם יש לך עיניים יבשות או הפרעות בקרנית (השכבה הצלולה בקדמת העין). אם אתה מרגיש תחושת עיניים לא נורמלית, עקצוץ או כאבים בעין לאחר השימוש בתרופה זו, שוחח עם הרופא שלך. (ראה גם סעיף 6 'מידע נוסף' על חומרים אחרים שהתרופה מכילה).

...

### 4. תופעות לוואי

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):  
רמות נמוכות של סוכר בדם, אי-ספיקת לב, סוג של הפרעה בקצב הלב, כאב בטן, הקאה, כאבי שרירים שלא נגרמו מפעילות גופנית, בעיות בתפקוד המיני, הזיות, תחושה של גוף זר בעין.