



DEVRIES & CO. LTD.

רח' הברזל 32 (ב)

רמת החייל

ת.ד. 53463

תל-אביב 61533

טל: 03-6444950

פקס: 03-6496661

E-MAIL: headoffice@devries.co.il

תאריך:

רופא/ה נכבד/ה,

רוקח/ת נכבד/ה,

Lemocin Cherry, Lemocin Cherry

חברת דיפריס ושות' בע"מ מבקשת להודיע על עדכון בעלון לצרכן של התכשיר, וכן על פרסום עלון לרופא חדש.

התוויה רשומה של התכשירים בישראל:

For the relief of pain associated with severe sore throat and mouth infections.

צורת המתן של התכשיר : תכשיר לבליעה

מרכיבים פעילים:

lidocaine	1 mg
tyrothricin	4 mg
cetrimonium bromide	2 mg

בהודעה זו מצוינים סעיפים בהם נעשה עדכון המהווה החמרה - מודגש **בצהוב**. מידע מהותי חדש מסומן **באדום**.

עדכונים בעלון לצרכן נעשו בסעיפים הבאים:

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- יש לך חתך או פצע ברירית הפה או הגרון,
 - יש לך כאב גרון המלווה בחום גבוה, סחרחורת, הקאה או אי-נוחות רבה בבליעה.
- לפני השימוש בתרופה עדכן את הרופא/רוקח אם אתה סובל ממחלה כלשהי או אם היו לך בעבר תגובות אלרגיות.

היריון והנקה

אין להשתמש בתרופה במהלך ההיריון או תקופת ההנקה.
אם את בהיריון, מניקה או מתכננת להיות בהיריון, יש להיועץ ברופא לפני השימוש בתרופות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה סורביטול. סורביטול הוא מקור לפרוקטוז. אם הרופא אמר לך שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים או אם אובחנת כבעל אי-סבילות תורשתית לפרוקטוז (הפרעה גנטית נדירה של חוסר יכולת לפרק פרוקטוז), התייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.
סורביטול עלול לגרום לאי-נוחות במערכת העיכול ויש לו השפעה משלשלת קלה.

אופן השימוש:

בזמן מציצת קלירוצין דובדבן ו/או קלירוצין לימון טבליה להקלת כאב גרון, יש להניע את הטבליה לאט בתוך הפה. אל תאפשר לה להתמוסס בתוך פנים הלחי!
בעת טיפול בשלפוחיות/אפטה, יש להניח לטבליה להתמוסס לאט ישירות על המקום הפגוע.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

מינון יתר של צטרימוניום ברומיד עלול לגרום לבחילות והקאות.
מינון יתר של לידוקאין עלול לגרום להשפעות מזיקות על מערכת העצבים המרכזית ועל מערכת הלב וכלי הדם.

4. תופעות לוואי

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם אתה חש באחת מהתופעות הבאות:

- תופעות אשר יכולות להעיד על תגובה אלרגית:

- קושי בנשימה או בבליעה,

- נפיחות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון,
- גרד חמור בעור המלווה בפריחה אדומה או בליטות בעור.
- שלשול מתמשך או חמור, שלשול עם דם ורירית, כאבים בטבור או התכווצויות ו/או חום,
- כאשר מופיע זיהום חדש,
- אם התסמינים מחמירים.
-

תופעות לוואי נוספות :

תופעות לוואי מופיעות נדירות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 מתוך 10,000 משתמשים) :
שימוש בטירותריצין על פצעים טריים יכול להוביל לדימום.

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000)

- גרד,
- בחילות, במיוחד כאשר משתמשים במינונים גבוהים של התרופה או כאשר הטבליות נלקחות על בטן ריקה (מיוחס ללידוקאין שהטבליות מכילות).

העלון מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug>

ניתן לקבלו מודפס באמצעות פניה לבעל הרישום, חברת חברת דיפריס ושות' בע"מ, רחוב הברזל 32, תל-אביב, טל. 03-6444950

בברכה,

מירי חזן
רוקחת ממונה