

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986**
يسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيبك

## أكامول تصينون وشِطَاعَت لليل

### حيسولات

### التركيبية

تحتوي كل حبسولة على:

پاراسيتامول 500 ملغ

پسيودو إفيدرين هيدروكلوريد 30 ملغ

ديكستروميثورفان هيدروبروميد 15 ملغ

كلورفينيرامين ماليات 2 ملغ

Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg
Chlorpheniramine maleate 2 mg

للحصول على معلومات عن المركّبات غير الفعّالة ومسيبات الأرجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركّبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا

تفوت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

**يجب عليك استعمال المستحضّر وفقًا للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة.** استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

أو إذا تفاقمّت أعراض المرض أو لم تحسّن بعد **5** أيام.

**هذا الدواء مخصّص للبالغين وللأولاد من سن 12 عامًا فما فوق.**

### 1. لأي غرض مخصّص هذا الدواء؟

الدواء مخصّص للتخفيف من الزكام، السعال واحتقان الأنف، التي تصحبها الحمّى والألام - للعلاج في الليل.

### الفصيلة العلاجية:

پاراسيتامول - مسكّن للألام وخافض للحرارة.

پسيودو إفيدرين - مخفّف لاحتقان الأنف.

ديكستروميثورفان - كابّط للسعال.

كلورفينيرامين - مضاد للهيستامين.

### 2. قبل استعمال الدواء

**لا يجوز استعمال هذا الدواء:**

- لا تستعملي الدواء إذا كنت حاملًا أو مرضعًا.
- إذا كانت لديك حساسية (أرجية) لپاراسيتامول، لپسيودو إفيدرين، لديكستروميثورفان، لكلورفينيرامين، لمضاد آخر للهستامين أو لمزيلات أخرى للاحتقان، أو لأحد مركّبات الدواء الأخرى (انظر البند 6).
- إذا كنت تتلقّى في نفس الوقت علاجًا بأدوية من فصيلة مثبّطات منو أمين أوكسيداز (MAOI) (للاكتئاب) أو بالأدوية المثبّطة لمنو أمين أوكسيداز المحكّمة (RIMAS) أو خلال 14 يومًا منذ إيقاف العلاج بها.
- إذا كنت تستعمل الأدوية المثبّطة لاسترداد السيروتونين الانتقائيّ [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو الفلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين.
- إذا كنت تستعمل الآن أو قد استعملت في الأسبوعين الأخيرين أدوية مضادة للاكتئاب، أدوية نفسية، أدوية للحالات العاطفية أو أدوية لمرض الپاركينسون.
- إذا كنت تتلقّى في نفس الوقت علاجًا بمزيلات احتقان أخرى، أدوية إضافية للسعال والزكام.
- إذا كنت تستعمل أدوية من فصيلة حاصرات بيتّا لعلاج مشاكل القلب.
- إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع جدًا (فرط ضغط الدم الخطير) أو من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة بواسطة الأدوية، أو من مرض في القلب أو الأوعية الدموية، أو كنت لديك سيرة مرضية من السكتة الدماغية.
- إذا وُجد لديك سكري.
- إذا كنت ولّدًا عموك دون الـ 12 عامًا.
- بالترّامن مع مستحضرات أخرى تحتوي على پاراسيتامول (إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الدواء الذي تستعمله يحتوي على پاراسيتامول، فاستشر الطبيب أو الصيدلي).
- إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد).
- إذا كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما - زرق).
- إذا وُجد لديك مرض كلوي حاد (فجائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكليتين.
- إذا كنت تعاني من ورم القوائم (ورم نادر في الغدة فوق الكلوية، يؤثّر على ضغط الدم ونظم القلب).
- إذا كنت تستعمل أدوية فاتحة أو كابّطة للشهية، أو أدوية للربو (الأدوية المحاكية للودية).

**تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء**

- تم الإبلاغ عن حالات من متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS) في أعقاب استعمال أدوية تحتوي على پسيودو إفيدرين. PRES وRCVS هما حالتان نادرتان يمكن أن ترتبطا بتزويد دموي متدنّ للدماع. توقف فورًا عن استعمال أكامول تصينون وشِطَاعَت لليل وتوجه لتلقّي المساعدة الطبية الفورية إذا نشأت لديك أعراض يمكن أن تكون علامات لـ PRES أو RCVS (للاطلاع على الأعراض انظر البند 4 "أعراض جانبية محتملة").
- إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تسبب أعراضًا جلدية خطيرة مرة أخرى.
- يحتوي المستحضر على پاراسيتامول، الذي قد يسبب ضررًا للكبد عندما:
  - يُعطى بجرعة دوّانية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة متواصلة.
  - يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
  - يتم استعمال أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة دون استشارة الطبيب.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الألام أو أدوية للزكام دون استشارة طبيب أو صيدلي، لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسمم من پاراسيتامول.
- يجب عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت على وشك الخضوع لفحوص مخبرية، لأنّ العلاج بالدواء قد يؤثّر على النتائج.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية من "فصيلة أكامول" و/أو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول.
- يجب الامتناع عن استعمال جرعة دوّانية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- إذا وُجدت لديك حساسية لأيّ غذاء أو لأيّ دواء، فعليك إخبار الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.
- استعمال هذا الدواء بشكل دائم لفترة زمنية طويلة قد يسبب الإدمان. تناول هذا الدواء كما هو مذكور في هذه النشرة.
- قبل العلاج بأكامول تصينون وشِطَاعَت لليل، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من:**
  - مرض أو خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية (مثل: مرض الشريان التاجي - انسداد الشرايين أو الأوردة)
  - مرض أو خلل في الجهاز التنفسي، مثل: ربو، التهاب القصبات، سعال متواصل، سعال مصحوب بالحمّى، بالطفح أو بالصداع المتواصل أو أي مشكلة أخرى في الرئتين
  - مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد
  - خلل في وظيفة الكلية
  - مشاكل في التبول أو تضخم البروستاتا (يسبب التبول بوتيرة عالية)
  - خلل في وظيفة الغدة الدرقية (ثيرويد)
  - خلل في وظيفة غدة البروستاتا
  - كنت مدمنًا الآن أو قد أدمنت في الماضي على الأفيونيّات، الكحول، أدوية ملزمة بوصفة طبيب أو المخدرات غير القانونيّة
- عانيت مؤخرًا من أعراض انسحاب الكحول أو المخدرات مثل: هياج عاطفي، قلق، تعرق أو ارتجافات
- صرع
- يرقان

### التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيبك وإضافات غذائية وفيّتامينات، فأكبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصةً

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواءً من الفصائل التالية، أو إذا أنهيت للتو علاجًا بهذه الأدوية:

- أدوية مضادة للكلورين (لعلاج التشنجات والتقلصات، مثل الأثروبين)
- أدوية مثبطة لاسترداد السيروتونين انتقائيّ [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو الفلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (**انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء"**)
- أدوية مضادة لتخثر الدم وخاصةً وارفارين
- أدوية مضادة للاكتئاب (**بما في ذلك مثبّطات MAO، RIMAS - انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء"**) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (**انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء"**)
- مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات
- أدوية للاكتئاب، للأعراض النفسية، لپاركينسون، أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (**انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء"**)
- موكلوبيماید - دواء مضاد للاكتئاب
- أدوية أخرى مضادة للهستامين بما في ذلك الأدوية المضادة للسعال والزكام (مثل: أدوية أخرى مضادة لاحتقان الأنف، انظر البند 2، **"لا يجوز استعمال هذا الدواء"**) والتي تسبب لك شعورًا بالنعاس
- أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جوانيثيدين، ميثيل دوبا، بريتيليوم وبيتانيدين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: حاصرات بيتّا - انظر البند 2، **"لا يجوز استعمال هذا الدواء"**)
- مستحضرات تحفّز عمل الإنزيمات في الكبد (مثل: الباربيطورات)
- أدوية مضادة للتشنجات (لعلاج الصرع) مثل: فينيتوين، كاربامازيبين
- ميثوكلوراميد أو دومپيريدون (لعلاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل إضافية في الهضم)
- كلورامفينيكول أو ريفامپيسين (مضاد حيوي)
- پروپينيسيد (لعلاج النقرس)
- كوليستيرامين (لتقليل فرط الدهنيّات في الدم)
- مستحضرات مضادات الالتهاب الالسترويدية
- أدوية للفلق وللنوم
- حبوب منع الحمل
- أدوية لعلاج الصداع النصفي - الميجرينا Ergot (alkaloids)
- جليكويزيد قلبي (دواء يعطى لعلاج اضطرابات نظم القلب، أو قصور القلب، مثل ديجوكسين)
- أدوية لمشاكل القلب مثل: كوريندين وأمبودارون
- أوكسيتوسين (دواء يُعطى أثناء الولادة لتقليص الرحم)
- تيربينافين لعلاج الثعلبات الفطرية
- سيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة جارة الدرقية الثانوي
- ميثاندون لعلاج الألم الشديد
- يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل فلوكلوكساسيلين flucloxacillin (مضاد حيوي) بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (High anion gap metabolic acidosis) مما يستوجب العلاج المستعمل، وقد يحدث خاصةً في حالات التضّضر الكلوي الخطير، الإنّتان (وضع تتواجد فيه الجراثيم وسمومها في الدم وتؤدي إلى تضّضر الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية المزمنة، وفي حالات تُستعمل فيها الجرعة اليومية القصوى من پاراسيتامول
- إذا كنت تستعمل سويًا مع أكامول تصينون وشِطَاعَت أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية مضادة للذهان، فقد تنشأ لديك تغيرات نفسية (مثل: هياج نفسي، هوسات، غيبوبة)، وأعراض إضافية مثل: حمّى فوق 38 درجة مئوية، ازدياد في وتيرة القلب، ضغط دم غير مستقر، منعكسات مبالغ فيها، تصلب العضلات، انعدام التنسيق الحركي و/أو أعراض ترتبط بالمعدة والأمعاء (غثيان، تقيؤات، إسهال).
- استعمال الدواء والطعام**

يجب تناول الدواء بعد وجبة الطعام.

**يجب هذا الدواء واستهلاك الكحول**

خلال فترة العلاج بهذا الدواء **لا يجوز استهلاك الكحول** بسبب زيادة الخطر لضرر في الكبد.

**لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت حاملًا أو مرضعًا.**

### السياقة واستعمال الماكينات

لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات الخطرة خلال فترة استعمال الدواء لأنّ هذا الدواء قد يخلّ باليقظة، قد تشعّر بالنعاس، بالدوار أو بتشوّش الرؤية. بالنسبة للأولاد، فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

### الاستعمال لدى الأولاد

هذا الدواء مخصّص للأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا، انظر البند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

### معلومات إضافية

تكمّن في المادة الفعّالة پسيودو إفيدرين إمكانية معاقرتها. الجرعة الدوائية المتزّيدة قد تكون سامة. قد يؤدي الاستعمال المطول إلى تناول جرعة أعلى من الموصى بها من أجل بلوغ التأثير المطلوب، وبالتالي يؤدي إلى تزايد خطر التعرض لفرط الجرعة الدوائية. يُمنع تجاوز الجرعة الدوائية ومدة العلاج الموصى بهما (انظر البند 3).

### معلومات هامة عن بعض مركّبات الدواء

تحتوي كل حبسولة 0.882-0.588 ملغ من الصوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الحبسولة، ولذلك يُعتبر خاليًا من الصوديوم.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

### الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:

**البالغون والأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا:**
2-1 حبسولة قبل النوم.

**عند الاستعمال بالتوازي مع أكامول تصينون وشِطَاعَت لليل:**
يُمنع تجاوز جرعة دوّانية من 8 حبسولات بالمجموع الكلي خلال 24 ساعة. (عند استعمال بالتوازي مع أكامول تصينون وشِطَاعَت لليل، يجب استبدال جرعة من أكامول تصينون وشِطَاعَت لليل بجرعة من أكامول تصينون وشِطَاعَت لليل، وعدم تناولها كإضافة للجرعة الدوائية القصوى الموصى بها أعلاه من أكامول تصينون وشِطَاعَت لليل).

**المرضى الذين عمرهم فوق 60 عامًا:**
يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنهم قد يكونون حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

**يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

**يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمّى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمّت علامات المرض أو لم تحسّن بعد 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء، أو في أي حالة تظهر فيها أعراض جديدة.**

### كيفية الاستعمال

لا يجوز المضغّ! يمكن شطر الحبسولة في خط الشطر.

يجب بلع الحبسولة مع كأس ماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فيجب التوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك. حتى لو كان شعورك جيدًا، فإن العلاج الفوري ضروري، **بسبب خطر تطور ضرر شديد للكبد.** قد تكون الأعراض الجانبية: الغثاير، الإسهال، فقدان الشهية، الأم البطن، الانتفاخ، التورق المتزايد، الألم أو الحساسية في الجزء العلوي من البطن. من المحتمل أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد. تقلص العضلات، هياج نفسي، ارتباك، ميل إلى النوم، تضّضر مستوى اليقظة (الوعي)، حركات سريعة ولا-إرادية في العينين، مشاكل قلبية (نظم قلبي سريع)، مشاكل في التنسيق الحركي، اضطراب نفسي شديد مصحوب بالهوسات، ميل إلى الانفعال المفرط.

**إذا نسيتم تناول الدواء، فتناول الجرعة القادمة بحسب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل.** لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

**مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى نشوء أعراض جانبية. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.**

### أعراض جانبية خطيرة

**يجب إيقاف العلاج بشكل فوري والتوجه لتلقّي العلاج الطبي المستعمل:**

إذا تطوّرت لديك أعراض يمكنها أن تكون علامات لمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS). تشتمّل العلامات على:

- ظهور فجائي لصداع خطير
- غثيان
- تقيؤات
- ارتباك
- اختلاجات
- تغيرات في الرؤية

**يجب إيقاف العلاج والتوجه فورًا إلى الطبيب:**

- إذا ظهرت ردود فعل تحسسية حادة مثل: الطفح الجلدي والحكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق و/أو الأطراف مما قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع
- قد يؤدي پاراسيتامول في حالات نادرة إلى ظهور أمراض جلدية حادة قد تكون علاماتها: الاحمرار، الطفح الجلدي، الحويصلات، التضّضر الجلدي الموسع.
- قد تظهر لدى الأعراض الجانبية الجلدية الحادة أيضًا إذا استعملت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركّب الفعّال پاراسيتامول دون حدوث مشاكل. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، فيجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري
- انزعاج في البطن
- دوار، نعاس، ارتباك
- هوسات (نادر) (سماع أصوات ورؤية مشاهد غير موجودة، أفكار ومشاعر غير منطقية)
- مشكلة في التبول، خاصةً لدى الرجال الذين يعانون من مشكلة في غدة البروستاتا
- إذا ظهرت علامات على حدوث تغيرات في الجهاز الدموي مثل: تعب غير مفسر، حالات نزيف دموي، فقر الدم، ظهور كدمات، نشوء التهابات بسهولة أكبر
- نظم قلبي غير منتظم، ضغط في الصدر
- آلم فجائي وخطير في البطن أو نزيف دموي شرجي (في فتحة الشرج) في أعقاب التهاب في الأمعاء الغليظة نتيجةً لتزويد دموي غير كافٍ
- انخفاض في جريان الدم إلى القلب مما قد يسبب الذنبة الصدرية (انزعاج أو ألم في الصدر، الرقبة، الظهر، الفك، الكتفين، الذراعين) أو النوبة القلبية
- سكتة دماغية (ضعف في الوجه، الذراعين أو الرجلين أو مشاكل في التكلم)
- ثوران فجائي للحمّى، احمرار الجلد، أو بثور صغيرة عديدة (أعراض محتملة لـ Acute Generalised Exanthematous Pustulosis - AGEP)
- والتي قد تحدث خلال أول يومين من العلاج بهذا المستحضر
- فقدان فجائي للبصر
- مشاكل في الكبد بما في ذلك اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)
- انعدام التنسيق الحركي
- ارتباك لدى المسنّين

### أعراض جانبية إضافية:

**أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - قد تؤثر على أكثر من مستعمل 1 من بين 10 مستعملين**

**أعراض جانبية شائعة (common) - قد تؤثر على مستعمل 1 كحد أقصى من بين 10 مستعملين**

- صعوبات في النوم، عصبية، دوار
- جفاف الفم أو غثيان

**أعراض جانبية مدى شيوعا غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد)**

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- قلق، شعور بعدم الهوء، تهيجيّة، تؤثر أو شعور بالسعادة المتطرفة
- اضطرابات في النوم
- نبض سريع أو غير منتظم أو خفقان القلب
- نعاس
- ضعف دم مرتفع
- آلام البطن، إسهال، تقيؤ
- آلم عند التبول
- تميل في راحتي اليدين والقدمين
- ارتجاف
- انخفاض في التيار الدموي إلى العصب البصري (Ischaemic optic neuropathy)
- الاعتماد والإيمان - إذا إيقاف استعمال الدواء قد تشعّر بأعراض الانسحاب، التي تشتمل على: شعور بعدم الهوء، مصحوبات في النوم، تهيجيّة، قلق، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، تقيؤات وغثيان، إسهال، ارتجاف، تعرق
- تعب
- جفاف الفم، انعدام الشهية، حرقة المعدة
- كوابيس، اكتئاب، انخفاض ضغط الدم، طفح جلدي، حساسية للضوء، غثيان، تزايد لزوجة المخاط (قد يسبب السعال أو الالتهم)
- طين في الأنئين، تشوّش الرؤية، عدم القدرة على التركيز، الشعور بالمرض، ضعف العضلات، تقلّص العضلات، فرط الحركة لدى الأولاد، مشاكل في مقاييس الدم مثل فقر الدم
- عد دموي مخفّض، التهاب الكبد - هيباتيتيس (آلم شديد في البطن، غثيان، تقيؤات وفقدان الشهية)

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.**
**التبليغ عن الأعراض الجانبية**
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى المستشارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:
**https://sideeffects.health.gov.il**

### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف، فيما دون 25°C.**
- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

**بالإضافة إلى المواد الفعّالة، يحتوي الدواء أيضًا على:**

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, hypromellose, silicon dioxide, stearic acid, magnesium stearate, polyvinyl alcohol, macrogol 3350 (polyethylene glycol), talc, titanium dioxide, erythrosine aluminum lake, F&D blue #1/brilliant blue FCF aluminum lake.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:**
حبسولة مطبّعة على شكل كبسولة، محدبة من كلا جانبيها، بنفسجية اللون، على أحد جانبيها خط للشطر وجانبها الآخر أملس.

تحتوي العبوة على 14 حبسولة.

**اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:**

تُقعّ إسرائيل م.ض، شارع دقوره هانيقيته 124، تل أبيب 6944020

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**

136.48.31129

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

Acamol Tsinun&Shapaat Night Tabs PL MW0724

# teva