

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986**

يُسبق هذا الدواء بدون وصفة طبيبك

## أكامول تصينون وشِبَاعَت للنهار

## حبسولات

## التركيبة

تحتوي كل حبسولة على:

باراسيتامول 500 ملغ

پسيودو إفيدرين هيدروكلوريد 30 ملغ

ديكستروميثورفان هيدروبيوميد 15 ملغ

Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الارجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و البند 6 - "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك** للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة

عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

**يجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة.**
**استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.**
**عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت الحثى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمّت أعراض المرض أو لم تحسّن بعد 5 أيام.**

**هذا الدواء مخصص للبالغين وللاولاد من سن 12 عاماً فما فوق.**

### 1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من الزكام، السعال واحتقان الأنف، التي تسببها الحثى والالام - للعلاج في النهار.

**الفصلية العلاجية:**

باراسيتامول - مسكن للألام وخافض للحرارة.

پسيودو إفيدرين - مخفف لاحتقان الأنف.

ديكستروميثورفان - كابيت للسعال.

### 2. قبل استعمال الدواء

**لا يجوز استعمال هذا الدواء:**

- إذا كانت لديك حساسية (أرجية) لباراسيتامول أو لپسيودو إفيدرين، أو لديكستروميثورفان أو لمزيلات أخرى للاحتقان، أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- إذا كنت تتلقى في نفس الوقت علاجاً بأدوية من فصيلة مثبّطات منو أمين أوكسيداز (MAOI) (للاكتئاب) أو بالأدوية المثبطة لمونو أمين أوكسيداز العكوسة (RIMAS) أو خلال 14 يوماً منذ إيقاف العلاج بها.
- إذا كنت تستعمل الأدوية المثبطة لاسترداد السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الآخرين.
- إذا كنت تستعمل الآن أو قد استعملت في الأسبوعين الآخرين أدوية مضادة للاكتئاب، أدوية نفسية، أدوية للحالات العاطفية أو أدوية لمرض الباركنسون.
- إذا كنت تتلقى في نفس الوقت علاجاً بمزيلات احتقان أخرى، أدوية إضافية للسعال والزكام.
- إذا كنت تستعمل أدوية من فصيلة حاصرات بيتّا لعلاج مشاكل القلب.
- إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع جداً (فرط ضغط الدم الخطير) أو من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة بواسطة الأدوية، أو من مرض في القلب أو الأوعية الدموية، أو كانت لديك سيرة مرضية من السكتة الدماغية.
- إذا كنت تعاني من السكري.
- إذا كنت وأذا عمرك دون الـ 12 عاماً.
- بالترامن مع مستحضرات أخرى تحتوي على باراسيتامول (إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الدواء الذي تستعمله يحتوي على باراسيتامول، فاستشر الطبيب أو الصيدلي).
- إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد).
- إذا كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما - زرق).
- إذا وُجد لديك مرض كلوي حاد (فحائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكليتين.
- إذا كنت تعاني من ورم القواتم (ورم نادر في الغدة فوق الكلوية، يؤثر على ضغط الدم ونظم القلب).
- إذا كنت تستعمل أدوية فاتحة أو كابئة للشهية، أو أدوية للربو (الأدوية المحاكية للودية).

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**

- تم الإبلاغ عن حالات من متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS) في أعقاب استعمال أدوية تحتوي على پسيودو إفيدرين. PRES و-RCVS هما حالتان نادرتان يمكن أن ترتبطا بتزويد دموي متدنّ للدماغ. توقف فوراً عن استعمال أكامول تصينون وشِبَاعَت للنهار وتوجه لتلقي المساعدة الطبية الفورية إذا نشأت لديك أعراض يمكن أن تكون علامات لـ PRES أو RCVS (لاطلاع على الأعراض انظر البند 4 "أعراض جانبية محتملة").
- إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على باراسيتامول، كي لا تسبب أعراضاً جلدية خطيرة مرة أخرى.
- يحتوي المستحضر على باراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً للكبد عندما:
  - يعطى بجرعة دوائية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة متواصلة.
  - يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
  - يتم استعمال أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة دون استشارة الطبيب.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الالام أو أدوية الزكام دون استشارة طبيب أو صيدلي، لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسمم من باراسيتامول.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية من "فصيلة أكامول" وأو مستحضرات إضافية تحتوي على باراسيتامول.
- يجب الامتناع عن استعمال جرعة دوائية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- إذا وُجِدت لديك حساسية لأي غذاء أو لأي دواء، فعليك إخبار الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.
- استعمل هذا الدواء بشكل دائم لفترة زمنية طويلة قد يسبب الإدمان. تناول هذا الدواء كما هو مذكور في هذه النشرة.

**قبل العلاج بأكامول تصينون وشِبَاعَت للنهار، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من:**

- مرض أو خلل في وظيفة القلب وأ/أو الأوعية الدموية (مثل: مرض الشريان التاجي - انسداد الشرايين أو الأوردة)
- مرض أو خلل في الجهاز التنفسي، مثل: ربو، سعال متواصل، سعال مصحوب بالحُمى، بالطفح أو بالصداع المتواصل
- مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلية
- مشاكل في التبول أو تضخم البروستاتا (بسبب التبول بوتيرة عالية)
- خلل في وظيفة الغدة الدرقية (ثيرويد)
- خلل في وظيفة غدة البروستاتا
- كنت مدمناً الآن أو قد أدمنت في الماضي على الأفيونيات، الكحول، أدوية ملزمة بوصفة طبيب أو المخدرات غير القانونية
- عانيت مؤخراً من أعراض انسحاب الكحول أو المخدرات مثل: هياج عاطفي، قلق، تعرق أو ارتجافات
- يرقان

**التفاعلات بين الأدوية**

**إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيبك وإضافات غذائية وفييتامينات، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.** خاصةً يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواءً من الفصائل التالية، أو إذا أنهيت للتو علاجاً بهذه الأدوية:

- أدوية مضادة للكلوين (لعلاج التشنجات والتقلصات، مثل الأتروبين)
- أدوية مثبطة لاسترداد السيروتونين انتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الآخرين **(انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")**
- أدوية مضادة لتخثر الدم وخاصة وأرقارفين
- أدوية مضادة للاكتئاب **(بما في ذلك مثبّطات MAO، RIMAS - انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")** أو إذا استعملتها في الأسبوعين الآخرين
- مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات
- أدوية للاكتئاب، للأمراض النفسية، للباركنسون، أو إذا استعملتها في الأسبوعين الآخرين **(انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")**
- موكلوباميد - دواء مضاد للاكتئاب
- أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جوانيثيدين، ميثيل دوبا، adrenergic neuron blocker، بريتيليم وبيثاندين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: حاصرات بيتّا - **انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء"**، حاصرات ألفا أو موسعات الأوعية الدموية) وأدوية (مثل: أمبودارون، كوريندين)
- مستحضرات تحفز عمل الإنزيمات في الكبد (مثل: فيينيتوين [للتشنجات]، الباربيورات)
- أدوية مضادة للتشنجات (لعلاج الصرع) مثل: فييتوتين، كاربامازيبين
- ميثوكلوراميد أو دومبيريدون (لعلاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل إضافية في الهضم)
- كلورامفينيكول أو ريفامپيسين (مضاد حيوي)
- بروبينيسيد (لعلاج القرص)
- كولميسيرامين (لتقليل فرط الحثيات في الدم)
- مستحضرات مضادات الالتهاب للاستيررويدية

حذوب منع الحمل

جليكوزيد قلبي (دواء يعطى لعلاج اضطرابات نظم القلب، أو قصور القلب، مثل ديجوكسين)
قلويدات الإرجوت (ergot alkaloids) - لعلاج الميجرينا مثل: إيرجوتامين أو methysergide

أوكسيتوسين (دواء يُعطى أثناء الولادة لتقليص الرحم)

تيربينافين لعلاج الفطريات

سينكالكسيت لعلاج فرط نشاط الغدة جارة الدرقية الثانوي

ميثادون لعلاج الألم الشديد

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل فلوكلوكساسيلين flucloxacillin (مضاد حيوي) بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (High anion gap metabolic acidosis) مما يستوجب العلاج المستعجل، وقد يحدث خاصةً في حالات

التضرر الكلوي الخطير، الإنتان (وضع تتواجد فيه الجراثيم وسمومها في الدم وتؤدي إلى تضرر الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية المزمنة، وفي حالات تُستعمل فيها الجرعة اليومية القصوى من باراسيتامول

إذا كنت تستعمل سوياً مع أكامول تصينون وشِبَاعَت أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية مضادة للذهان، فقد تنشأ لديك تغيرات نفسية (مثل: هياج نفسي، هلوسات، غيبوبة)، وأعراض إضافية مثل: حمّى فوق 38 درجة مئوية، ازدياد في وتيرة القلب، ضغط دم غير مستقر، منعكسات مبالغ فيها، تصلب العضلات، انعدام التنسيق الحركي وأو أعراض ترتبط بالبعدة والأمعاء (غثيان،

تقيؤات، إسهال).

**استعمال الدواء والطعام**

يمكن تناول الدواء دون ارتباط بالطعام.

**استعمال هذا الدواء واستهلاك الكحول**

خلال فترة العلاج بهذا الدواء **لا يجوز استهلاك الكحول** بسبب زيادة الخطر لضرر في الكبد.

**الحمل والإرضاع**

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، نطّلين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين حملاً، فعليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

**الاستعمال لدى الأولاد**

هذا الدواء مخصص للأولاد الذين عمرهم فوق 12 عاماً، انظر البند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

**السياقة واستعمال الماكنات**

قد يجعلك الدواء تشعر بالتعب والدوار، ولذلك، قد يؤثر الدواء على قدرتك على السياقة أو استعمال الأدوات أو الماكنات.

لا يجوز السياقة وتشغيل الماكنات إلى أن تعلم كيف يؤثر الدواء عليك.

### معلومات إضافية

تتمكن في المادة الفعالة پسيودو إفيدرين إمكانية معاقرتها. الجرعة الدوائية المتزايدة قد تكون سامة. قد يؤدي الاستعمال المطول إلى تناول جرعة أعلى من الموصى بها من أجل بلوغ التأثير المطلوب، وبالتالي يؤدي إلى تزايد خطر التعرض لفرط الجرعة الدوائية. يُمنع تجاوز الجرعة الدوائية ومدة العلاج الموصى بهما (انظر البند 3).

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

تحتوي كل حبسولة على 0.588-0.882 ملغ من الصوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الحبسولة، ولذلك يُعتبر خالياً من الصوديوم.

تحتوي كل حبسولة على 6.5 ملغ من مونوهيدرات اللاكتوز. إذا قال لك طبيبك بأن لديك عدم تحمّل لأنواع معينة من السكر، فاستشر الطبيب قبل استعمال المستحضر.

يحتوي الدواء على الصبغ FD&C YELLOW #6/SUNSET YELLOW FCF الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

**الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:**

**البالغون والأولاد الذين عمرهم فوق 12 عاماً:** 1-2 حبسولات، كل 4-6 ساعات، حتى 4 مرات في اليوم.

يُمنع تجاوز جرعة دوائية من 8 حبسولات خلال 24 ساعة.

**عند الاستعمال بالتوازي مع أكامول تصينون وشِبَاعَت الليل** يُمنع تجاوز جرعة دوائية من 8 حبسولات بالمجموع الكلي خلال 24 ساعة. (يجب استبدال جرعة من أكامول تصينون وشِبَاعَت للنهار بجرعة من أكامول تصينون وشِبَاعَت الليل، وعدم تناولها كإضافة للجرعة الدوائية

القصوى الموصى بها أعلاه من أكامول تصينون وشِبَاعَت للنهار).

**المرضى الذين عمرهم فوق 60 عاماً:** يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنهم قد يكونون حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

**يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

**يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحثى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمّت علامات المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء، أو في أي حالة تظهر فيها أعراض جديدة.**

**كيفية الاستعمال**

لا يجوز المضغ أو الهرس! يمكن شطر الحبسولة في خط الشطر.

يجب بلع الحبسولة مع كأس ماء.

**إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ،** فيجب التوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك. حتى لو كان شعورك جيداً، فإن

العلاج الفوري ضروري، **بسبب خطر تطور ضرر شديد للكبد.** قد تكون الأعراض الجانبية: الغثيان والتقيؤ، الإسهال، فقدان الشهية، آلام البطن، الانتفاخ، التقرق المتزايد، الألم أو الحساسية

في الجزء العلوي من البطن ومن المحتمل أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد. تقلّص العضلات، هياج نفسي، ارتباك، ميل إلى النوم، تضرر مستوى اليقظة (الوعي)، حركات سريعة ولا-إرادية في العينين، مشاكل قلبية (نظم قلبي سريع)، مشاكل في التنسيق الحركي، اضطراب نفسي شديد مصحوب بالهلوسات، ميل إلى الانفعال المفرط.

**إذا نسيت تناول الدواء،** فتناول الجرعة القادمة بحسب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول جرعة

مضاعفة.

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتلك من الجرعة في كل مرة تناول فيها دواء.**

**ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.**

**إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.**

## 4. الأعراض الجانبية

**مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى نشوء أعراض جانبية. لا تتلق عند قراءة قائمة**

**الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.**

**أعراض جانبية خطيرة**

**يجب إيقاف العلاج بشكل فوري والتوجه لتلقي العلاج الطبي المستعجل:**

إذا تطورت لديك أعراض يمكنها أن تكون علامات لمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS). تشملّ العلامات

على:

- طنش
- غثيان
- تقيؤات
- ارتباك
- اختلاجات
- تغيرات في الرؤية

**يجب إيقاف العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب:**

- إذا ظهرت ردود فعل تحسسية حادة مثل: الطفح الجلدي والحكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق وأ/أو الأطراف مما قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع
- قد يؤدي باراسيتامول في حالات نادرة إلى ظهور أمراض جلدية حادة قد تكون علاماتها: الاحمرار، الطفح الجلدي، الحويصلات، التضرر الجلدي الموسع. قد تظهر الأعراض الجانبية الجلدية الحادة أيضاً إذا استعملت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركّب الفعّال باراسيتامول دون حدوث مشاكل. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، فيجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري
- انزعاج في البطن
- دوار، غثاس، ارتباك
- هلوسات (نادر) (سماع أصوات وروية مشاهد غير موجودة، أفكار ومشاعر غير منطقية)
- مشكلة في التبول، خاصةً لدى الرجال الذين يعانون من مشكلة في غدة البروستاتا
- إذا ظهرت علامات على حدوث تغيرات في الجهاز الدموي مثل: تعب غير مفسر، حالات نزيف دموي، ظهور كدمات، نشوء التهابات بسهولة أكبر

نظم قلبي غير منتظم

آلم فجائي وخطير في البطن أو نزيف دموي شرجي (في فتحة الشرج) في أعقاب التهاب في

الأمعاء الغليظة نتيجة لتزويد دموي غير كافٍ

انخفاض في جريان الدم إلى القلب مما قد يسبب الذبحة الصدرية (انزعاج أو ألم في الصدر، الرقبة، الظهر، الفك، الكتفين، الذراعين) أو الوفاة القلبية

سكتة دماغية (ضعف في الوجه، الذراعين أو الرجلين أو مشاكل في التكلم)

ثوران فجائي للحمى، احمرار الجلد، أو بثور صغيرة عديدة (أعراض محتملة لـ Acute AGEP - Generalised Exanthematous Pustulosis) والتي قد تحدث خلال

أول يومين من العلاج بهذا المستحضر

فقدان فجائي للبصر

**أعراض جانبية إضافية:**

**أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - قد تؤثر على أكثر من مستعمل 1 من بين 10 مستعملين**

**صداع**

**أعراض جانبية شائعة (common) - قد تؤثر على مستعمل 1 كحد أقصى من بين 10 مستعملين**

- صعوبات في النوم، عصبية، دوار

جفاف الفم أو غثيان

**أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوها بعد)**

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)

- قلق، شعور بعدم الهدوء، تهيجيّة، تؤثر أو شعور بالسعادة المتطرفة

اضطرابات في النوم

نفض سريع أو غير منتظم أو خفقان القلب

نعاس

ضغط دم مرتفع

آلام البطن، إسهال، تقيؤ

آلم عند التبول

تتميل في راحتي اليدين والقدمين

ارتجاف

انخفاض في التيار الدموي إلى العصب البصري (Ischaemic optic neuropathy) (الاعتماد والإدمان - عند إيقاف استعمال الدواء قد تشعر بأعراض الانسحاب، التي تشملّ

على: شعور بعدم الهدوء، صعوبات في النوم، تهيجيّة، قلق، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم،

تقيؤات وغثيان، إسهال، ارتجاف، تعرق

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: **https://sideeffects.health.gov.il**

## 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأ/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدوّن على العبوة. يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

**يجب التخزين في مكان جاف، فيما دون 25°C.**

لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

**بالإضافة إلى المواد الفعّالة، يحتوي الدواء أيضاً على:**

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, hypromellose (hydroxypropyl methylcellulose), silicon dioxide, stearic acid, magnesium stearate, lactose monohydrate, HPMC 2910/hypromellose 15cp, titanium dioxide, macrogol 4000 [polyethylene glycol], FD&C yellow #10 aluminum lake, FD&C yellow #6/sunset yellow FCF aluminum lake, FD&C blue #1/brilliant blue FCF aluminum lake.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:**

حبسولة مثلية على شكل كبسولة، محتوية من كلا جانبيه، خضراء اللون، على أحد جانبيها خط للشطر وجانبها الآخر أمّلس.

تحتوي العبوة على 21 حبسولة 35 أو 30 حبسولة. قد لا تُسوّق جميع العبوات.

**اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:**

تيفع إسرائيل لم.رض، شارع دافوره هانفييه 124، تل أبيب 6944020.

**تم تحرير هذه النشرة في تموز/ يوليو 2024.**

**رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**

136.49.31130

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلال الجنسين.